

Einige spirometrische Beobachtungen
nebst einem Rückblick auf die
**bis jetzt aufgestellten Methoden zur Bestimmung
der physikalischen Vitalcapacität.**

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des

Herrn Obermedicinalraths

PROF. DR. VON ZIEMSEN

Direktor des Krankenhauses in München links der Isar

der

hohen medicinischen Facultät zu München

vorgelegt

von

GEORG CORNET

pract. Arzt.

München, 1884.

K. HOF- U. UNIVERSITAETS-BUCHDRUCKEREI V. DR. C. WOLF & SOHN.

Einige spirometrische Beobachtungen
nebst einem Rückblick auf die
**bis jetzt aufgestellten Methoden zur Bestimmung
der physikalischen Vitalcapacität.**

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des

Herrn Obermedicinalraths

PROF. DR. VON ZIEMSEN

Direktor des Krankenhauses in München links der Isar

der

hohen medicinischen Facultät zu München

vorgelegt

von

GEORG CORNET

pract. Arzt.

München, 1884.

K. HOF- U. UNIVERSITAETS-BUCHDRUCKEREI V. DR. C. WOLF & SOHN.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Nachdem schon in früherer Zeit mehrere Physiologen die vitale Capacität der menschlichen Lunge zu ermitteln versucht, aber durch die Mangelhaftigkeit der Methoden und der ihnen zu Gebote stehenden Hilfsmittel weit auseinander gehende Resultate erhalten hatten, war Hutchinson der Erste, dem es durch die Erfindung eines vervollkommenen, den physikalischen Anforderungen entsprechenden Apparates, seines Spirometers, ermöglicht war, zu exacten Ergebnissen zu gelangen. Er war es auch, der die Abweichung früherer Untersuchungsmethoden größtentheils auf die Aufserachtlassung wesentlicher Punkte zurückführte, als welche er insbesondere die Gröfse, das Alter, das Geschlecht und das Gewicht der untersuchten Personen betrachtete. Die Zahl der von ihm in Untersuchung gezogenen Personen belief sich auf 2130, vorzüglich Leute des kräftigsten Schlages, Matrosen, Soldaten, Policisten. Eine Zusammenstellung seiner Versuche zeigte ihm vor Allem aufs Klarste, wie die Vitalcapacität des Menschen, d. h. also diejenige Luftmenge, die nach tiefster Inspiration mit Anstrengung aller Expirationsmuskeln expirirt werden kann, in regelmäßiger Progression mit der Höhe der untersuchten Individuen stieg. Das Verhältniß der Progression stellte Hutchinson auf 131 ccm. für je $2\frac{1}{2}$ cm. Höhenzunahme von 150 cm. Höhe an fest.

Den Einfluß der Schwere auf die Vitalcapacität erachtete der befagte Verfasser als zwar weniger regelmäfsig, gleichwohl

aber der Berücksichtigung werth, indem sich ein Zuwachs von 16,4 ccm. pro Pfund von 105—155 Pfund ergebe, dann aber von 155—200 Pfund diese Zunahme aufhöre.

Das verschiedene Alter der untersuchten Personen zeigte weiters einen Einfluß der Lebensperiode insoferne, als vom 15.—35. Jahre sich eine Steigerung des Athmungsvermögens, von 35—65 Jahre ein Abfall bemerkbar mache und zwar von etwa 16,4 ccm. für jedes Jahr.

Durch seine Beobachtungen über den Brustumfang glaubte sich Hutchinsonson zu dem Schlusse berechtigt, daß „die absolute Breite der Brust keinen unmittelbaren oder beständigen Maßstab für die Schätzung der vitalen Capacität abgiebt“, wenn sich auch in beschränkten Fällen ein Einfluß nicht leugnen lasse.

Für beachtenswerth hielt er den Zusammenhang des Brustumfanges mit der Körper schwere, der mit ihr in genauer arithmetischer Progression von $2\frac{1}{2}$ cm. für je 10 Pfund steige.

Einen Zusammenhang der Brusttiefe mit der Höhe des Individuums stellt Hutchinsonson in Abrede, während er für die Beweglichkeit der Brustwandungen einen bedeutenden Einfluß auf das Vitalvermögen beansprucht. Bei dieser Gelegenheit sucht er der allgemein herrschenden Ansicht, als ob bei tiefer Inspiration hauptsächlich die Thätigkeit des Zwerchfelles in Betracht komme, entgegen zu treten, indem er zwar die gewöhnliche Athembewegung durch das Abwärtssteigen des Zwerchfells bewirken läßt, bei tiefer Inspiration hingegen an Schattenriffen stets nur eine Erweiterung der Brusthöhle durch die Thätigkeit der Rippen nicht aber des Zwerchfelles beobachtet haben will.

Untersuchungen über die Kraft der Ein- und Ausathmungsmuskeln, die dadurch angestellt wurden, daß durch das Ein- resp. Ausathmen in ein Quecksilbermanometer durch die Nase: die eine Quecksilberfäule gehoben resp. gesenkt

wurde, ergaben ein Ueberwiegen der Expirationskraft um $\frac{1}{3}$, das Hutchinſon vorwiegend auf Rechnung der beim Ausathmen mit in Aktion tretenden Rippen- und Lungenelaſticität ſchreibt. Was die Kraft der Athmungsmuskeln im Verhältniß zur Athmungsgröße betrifft, ſo ergaben Hutchinſon's Verſuche, daß die vitale Capacität mit der Kraft der Muskeln ſteige und falle, die Kraft der Inſpiratoren am beträchtlichſten bei einer Höhe von circa 170 cm. ſei und dann allmählich (etwa 1,3 mm. für 1 cm. Höhe) falle. Ein Maßſtab läßt ſich zunächſt nur an die Kraft der Inſpiratoren anlegen, inſofern dieſe uns mit Luft verſehen, während die Exſpiratoren durch Uebung wie Trompetenblaſen etc. in ihrer Stärke weſentlich alterirt werden können und daher auch bei Gefunden großen Schwankungen unterliegen.

Auf die Wichtigkeit der Spirometrie, ſoweit ſie nach Hutchinſon ſowohl für die Diagnostik als für das öffentliche Leben, den Militärdienſt etc. in Frage kommt, wollen wir ſpäter näher eingehen.

Bald nachdem Hutchinſon ſeine umfangreiche und grundlegende Arbeit veröffentlicht hatte, ging Simon unter Vogels Leitung daran, Controlverſuche in gleicher Richtung anzustellen, zu denen er ein in ſeiner Conſtruktion vereinfachtes, in ſeinen Ergebniffen aber dem von Hutchinſon angegebenen gleichzuſtellendes Inſtrument verwendete.

Während Hutchinſon zu ſeinen Verſuchen, wie oben erwähnt, überwiegend äußerſt robuſte junge Männer, die größtentheils im Militärdienſte ſtanden, verwendete, waren Simon meiſt Studenten und Handwerker von weniger auffallender Körperſtärke zu Gebote, und es erklärt ſich das ſelbe wohl mit Recht daraus, daß ſeine Reſultate über das Verhältniß der Vitalcapacität zur Körperlänge im Ganzen etwas niedriger ſtehen, gleichwohl aber dem wirklichen Durchſchnittsmaße näher kommen. Das Progreſſionsverhältniß von je

2 $\frac{1}{2}$ cm. Höhe stellte Simon auf 150 ccm. fest, wie es auch später von Arnold bestätigt wurde.

Den Einfluss des Gewichtes und Alters zieht Simon nicht in das Bereich seiner Untersuchungen, da er sie für zu wenig wichtig betrachtet. Auf das Entschiedenste bekämpft er Hutchinsons Ansicht, als ob der Brustumfang nicht wesentlich bei Beurtheilung der erforderlichen Vitalcapacität zu berücksichtigen sei. Die von diesem Autor erhaltenen negativen Resultate erklärt er aus der Aufserachtlassung des causalen Momentes der Thoraxvergrößerung, insoferne lediglich eine Erweiterung des Brustumfanges, die mit einer physiologischen stärkern Entwicklung der Brusthöhle Hand in Hand geht, die vitale Capacität erhöht, nicht aber eine pathologische etwa durch Emphysem bemerkte Vergrößerung, wie ebensowenig eine übernormale Fettablagerung, welche im Gegentheil das Vitalvermögen herabsetzen. Das Progressionsverhältniss für 2 $\frac{1}{2}$ cm. Steigerung des Brustumfanges gibt er auf 191 ccm. an. Einen hohen Werth misst Simon auch noch der Beweglichkeit der Brust bei, ohne jedoch das Verhältniss in bestimmten Zahlen auszudrücken, da er die Anzahl seiner Versuche hiefür für zu gering erachtet.

Eine weitere Bearbeitung erfuhr die Spirometrie nun von Fabius, der die Berechnung nach der Länge des Körpers vollkommen verwarf und meinte, mit gleichem Rechte könnte man nach einem Verhältnisse zwischen der Länge der Ohren und der Vitalcapacität forschen, da die Höhe, die zunächst durch die Beine bestimmt werde, so wenig wie die Ohren mit der Lunge zu thun hätte. Er gibt nun einige Fälle an, darunter einen mit Infiltration der rechten Lunge, die eine über die Berechnung von Hutchinson und Simon weithinausgehende Vitalcapacität hatten. Indem Fabius nun von der Erwägung ausgeht, dass ein gewisser Theil des Brustkorbes stets von Lunge, Herz und den Gefäßen etc. erfüllt sei, und alle diese aber in dem Brustkorbe gesunder Menschen stets

den gleichen Bruchtheil einnehmen, hält er die Bestimmung der Capacität des Brustkorbes für den geeigneten Weg, um daraus auf die Lungen-Capacität zu schliessen, wobei er noch grossen Werth auf die Beweglichkeit des Brustkorbes legt. In Betracht kommen somit nach ihm vorzüglich die Masse des Brustumfanges, der Beweglichkeit und der Länge der Brust, für welche letzteres er bei der Schwierigkeit, sie genau zu bestimmen, die Länge des Rumpfes vom Hinterhaupteck bis zum Steissbein wählt, von der die Brustlänge immer einen bestimmten Theil ausmache. Den Umfang und die Beweglichkeit bestimmte er nach der weiter unten angegebenen Methode, die auch Hutchinson bereits angewandt hatte.

Da die Brust nun kein regelmässiger Cylinder ist und sich also nicht gleichmässig ausdehnt, so musste die Bestimmung des Rauminhalts auch nach einer allgemeineren Formel geschehen, als nach der sonst der Cylinderinhalt bestimmt wird, und Fabius wollte dieselbe dadurch gefunden haben, dass er die gefundene Vitalcapacität durch das Produkt aus der Rumpfhöhe mit dem Brustumfang dividirt.
$$\left(\frac{V. C.}{\text{Umf.} \times \text{Höhe}} \right)$$
 Die sich bei verschiedenen Berechnungen nach dieser Formel ergebenden Differenzen sucht er durch die Verschiedenheit des Alters und der Brustbeweglichkeit zu begründen. Fabius gibt selbst zu, dass seine berechneten Werthe von den gefundenen oft bedeutend abweichen, beansprucht aber gleichwohl für sie grössere Richtigkeit als für die von Hutchinson und Simon. Versuche mit Regniers Dynamometer bestätigten auch Fabius, was Albers schon vorher beobachtet, dass ohne Rücksicht auf die Thoraxcapacität stärkere Menschen relativ grössere Luftmengen aus- und einathmen können als schwächere. Für Turner konstatirt Fabius im Allgemeinen eine subnormale Vitalcapacität, insofern sie nämlich durch Ueberanstrengung und öfteres rasches und starkes Ausdehnen der Lungen sich Emphysem zugezogen haben. Gleich Hutchinson fand auch er das ausgeathmete Luftvolumen beim

aufrechten Stehen vermehrt, nach der Mahlzeit sowie durch Verstopfung vermindert, durch den Gebrauch von Electuarium lenitivum bei feinem Diener wieder erhöht. Versuche vor und nach der Schwangerschaft ergaben ein ähnliches Resultat wie es Küchenmeister gefunden d. h. während der Schwangerschaft etwas erhöhte Capacität als 10 Tage nach der Geburt.

Der nächste nun, der der Spirometrie seine Aufmerksamkeit schenkte, war Voorhelm Schneevogt. Er untersuchte 300 Personen und machte über 130 genauere Daten. Seine erste Tabelle über 30 gesunde Männer nimmt Rücksicht auf Alter, Höhe, gefundene und nach Hutchinson berechnete Vitalcapacität. Aus den gewonnenen Resultaten schließt er 1) daß die von Hutchinson angenommene Vitalcapacität wenigstens für unsere Landsleute durchgängig zu hoch ist und zwar um circa 500 ccm. und 2) daß, wenn man von jedem andern Faktor abieht, und allein die Länge der Person in Anschlag bringt, die meisten Erfahrungen mit dem Hutchinson'schen Gesetze übereinstimmen, nur scheint bei 180 cm. Höhe die Ausnahme zahlreicher zu werden.¹⁾

Die Frauen, deren Schneevogt 40 untersuchte, zeigten alle eine geringere Vitalcapacität als die Männer und zwar im Durchschnitt um 600–700 ccm. weniger, theilweise wie der Forscher angiebt: aus Aufregung und Ungeschicklichkeit, vorzugsweise aber wegen Kürze des Brustkastens und geringeren Umfang der Lungen. Durchschnittlich hat nach ihm eine Frau von 150 cm. Länge 2000 ccm. Vitalcapacität und für jeden cm. Höhe 30 ccm. mehr.

Nach Schneevogt verdanken wir neuere Mittheilungen Wintrich, die derselbe in Virchows Archiv erscheinen liefs. Wintrich machte auf eine Fehlerquelle des Simon Vogel'schen Instrumentes aufmerksam, das den Wasserspiegel

¹⁾ Bei sehr athletischen Figuren beobachtete Schneevogt, daß die gefundene Capacität die nach der Höhe berechnete selbst um 750 ccm. übersteigt.

im innern Gafometer der Beobachtung entziehe und einen etwaigen Ausgleich bei Tieffstunde, wie er sich gewöhnlich findet, unmöglich macht. Dem Umfande schreibt er es auch zu, daß Simon niedrigere Zahlen als er und Hutchinsonson gefunden haben. Wintrich konnte seine Untersuchungen auf 3500 gesunde Individuen, darunter 500 nicht schwangere und 52 schwangere Weiber ausdehnen. Als beachtenswerth hält er zunächst die Gröfse, das Alter, das Geschlecht und einige Nebenumstände, während er die andern von seinen Vorgängern berücksichtigten Momente z. B. Körpergewicht auch physiologisch so sehr schwankend fand, daß sie sich bei der Untersuchung nicht verwerthen ließen.

Die Gröfse allein ohne Berücksichtigung des Alters gibt nach ihm kein fachgemäßes Urtheil. Die grösste Vitalcapacität fand er zwischen dem 20.—40. Lebensjahre. Während dieser Zeit kommen bei Männern auf etwa 1 cm. Höhe mehr zwischen 22—24 ccm. Luft, bei Weibern dagegen 16—17,5 ccm. Einen dominirenden Einfluß schreibt Wintrich dem Alter zu. Zwischen 6—8 Jahren kommen auf 1 cm. Gröfse bei Knaben und Mädchen nur zwischen 6,5—9 ccm. Vitalcapacität; zwischen 8—10 Jahren zwischen 9 und 11 ccm.; von 10—12 Jahren zwischen 11 und 13 ccm.; von 12—14 Jahren zwischen 13 und 15 ccm. Von 15 bis 20 Jahren machte Wintrich wenige Beobachtungen, glaubt aber, daß sich von da an der Geschlechtsunterschied sehr bemerkbar mache und zwar je nach der rascheren Entwicklung in verschieden hohem Grade. Zwischen 40 und 50 Lebensjahren sinkt die Athmungsgröfse kaum 1 cm. unter die Minusgrenze beider Geschlechter auf 1 cm. Höhenunterschied. Zwischen 50—60 Jahren treten grofse Schwankungen ein, welche vorzüglich durch den beginnenden Marasmus und die sich einstellende Fettleibigkeit bedingt werden. Bei muskelkräftigen Greifen selbst von 64 Jahren und darüber, fand Wintrich eine Vitalcapacität, wie bei Leuten zwischen 45—55 Jahren. Man kann

daher in diesen Jahren keine arithmetische Regelmäßigkeit mehr annehmen. Im noch höheren Alter nach dem 76. Jahre beobachtete Wintrich ein auffälliges Zuruckfinken auf die Gröfse des puerilen Alters. Eine eigenthümliche Erscheinung constatirte er auch an diesen alten Leuten, dafs nämlich ihre Expiration nicht in continuirlichem Zuge sondern in 2—4—5 Abätzen vor sich geht. Alte Weiber finken weniger rasch als alte Männer von ihrer Athmungsgröfse, im übrigen erhält sich jedoch die Geschlechtsdifferenz bis ins höchste Alter.

Was die verschiedene Stellung oder Lage betrifft, so räumt Wintrich ein, dafs diejenige Seite, die beim Liegen unter der Last des Körpergewichtes steht, weniger frei athmet, als die entgegengesetzte, will jedoch ausserdem eine Zu- resp. Abnahme der Vitalcapacität bei Lageveränderung (Stehen oder Sitzen) lediglich bei muskelschwachen Individuen bemerkt haben, während er bei 34 kraftigen Soldaten stets zu gleichen Resultaten kam, nur beim Liegen machte sich eine kleine Differenz von etwa 20 ccm. geltend.

Einen herabsetzenden Einfluss von Speise und Getränken erkennt auch Wintrich an und schätzt ihn auf 80—200 ccm. je nach den genossenen Quantitäten. Durch Stuhlverstopfung resp. Stuhlgang fand Wintrich an sich selbst keine Aenderung der Vitalcapacität, gibt aber die Möglichkeit einer solchen bei Leuten mit sehr retardirter Defäcation zu.

Hinsichtlich der Athemfrequenz wird von Wintrich angegeben, dafs falls diese bei Gefunden durch excessive Bewegungen bedeutend vermehrt sei, eine Verflachung der Athmung und Verminderung des Expirationsvolumens bis auf $\frac{1}{6}$ des normalen stattfindet, ein Moment der bei acuten und manchen chronischen Krankheiten mit vermehrter Athemfrequenz nicht vernachlässigt werden darf. In verdichteter Luft in der Taucherglocke fand auch Wintrich an sich eine Vermehrung der Athemzüge um 5 in der Minute.

Der Schwangerschaft erkennt er nach seinen 52 Versuchen an Schwangeren keinen direkten Einfluss auf die Expirationsgröfse zu.

Eine auferordentlich gründliche und durchgreifende Bearbeitung ward der Spirometrie nun durch Arnold zu Theil, der in den meisten seiner Tabellen die von Simon und Fabius sowie die von ihm selbst beobachteten Fälle zusammenstellt und dadurch durch die gröfsere Anzahl der in Frage kommenden Fälle auch einen grofsen Anspruch auf die Richtigkeit der gewonnenen Resultate zu erheben berechtigt ist.

Bezüglich der Körperhöhe schliesst er sich dem vom Simon gegebenen Verhältniffe von einer Steigerung von 150 cm für je $2\frac{1}{2}$ cm Höhenzunahme an und bemerkt, dafs auch die Hutchinsonschen Fälle diesem Verhältniffe entsprechen, wenn die aus wenigen Beobachtungen gewonnenen Mittelwerthe eliminirt werden. Arnolds Werthe halten im Grofsen und Ganzen die Mitte zwischen den von Hutchinson und von Simon angegebenen. Während er die ersteren wegen der auffallenden kräftigen dort untersuchten Leute für zu hoch erklärt, spricht er sich über letztere nicht definitiv aus. Um des Fabius Behauptung, dafs die Rumpflänge mit der Vitalcapacität in einer wesentlicheren Beziehung stehe, als die Körperhöhe, näher zu prüfen, stellte Arnold die von Fabius mitgetheilten Fälle nach Körper- und Rumpfhöhe zusammen und fand, obgleich bei der Rumpfhöhe die Zahl der steigenden Gröfsen geringer ist, die Zunahme im Verhältnifs zu ihr weniger regelmäfsig als die zur Körperhöhe.

Es ergab sich übrigens, dafs die Differenzen bei gleicher Rumpfhöhe vielfach mit den Unterschieden in der Körperhöhe in Zusammenhang stehen und umgekehrt. Demgemäfs ist die Ansicht, als ob die Rumpfhöhe den Vorzug vor der Körperhöhe verdiene, nach Arnold zwar unrichtig, aber ihr gleichwohl als einem Ausdruck der Brustlänge ein Einfluss zuzugestehen. Für die Schwere erkennt Arnold einen Ein-

fluß nur infoferne an, als sie durch die Höhe bedingt wird, bestreitet aber die weiter oben angeführte Behauptung Hutchinsons, daß eine regelmässige Steigerung stattfinde. Auch hinsichtlich des Brustumfanges tritt er gleich seinen Vorgängern Simon und zum Theil auch Fabius der Hutchinson'schen Ansicht mit aller Entschiedenheit entgegen, indem er aus einer sehr übersichtlichen Zusammenstellung der Fabius und Simon'schen Fälle den Schluß zieht, daß die Athemgröfse um so regelmässiger mit der Steigung des Brustumfanges zunehme, eine je gröfsere Anzahl von Beobachtungen zu Grunde liege und daß im Mittel die Zunahme um 150 ccm für je $2\frac{1}{2}$ cm Steigung im Brustumfange stattfinde, so daß der Umfang der Brust einen ebenso grofsen Einfluß wie die Körperhöhe äußere. Durchschnittlich beträgt nach diesen Tabellen der Brustumfang 81 cm und differirt zwischen 66 und 101 cm. Um etwaige Fehlerquellen, die durch eine übergrofsere oder verminderte Muskulatur sich in die Rechnung einschleichen, zu compensiren, empfiehlt Arnold bei sehr mageren und muskelschwachen Männern etwa 5 cm dem beobachteten Mafse zuzusetzen, bei fetten und muskelkräftigen Männern aber je nach der Muskulatur und Fettablagerung 5—10 cm abzuziehen. Beim Weibe hätte man bei sehr schwacher Entwicklung der Brüste und grofser Magerkeit der Brustgegend 10 cm, bei geringer Ausbildung der Brüste 5 cm zuzuzählen, bei starker dagegen 5 bis 10 cm in Abzug zu bringen, da Hutchinson durch Messungen an Leichen von Männern und Frauen nachgewiesen hat, daß die Differenz zwischen dem äußern und innern Umfang des Brustkastens beim Manne circa 10, beim Weibe circa 15 cm beträgt und bei beiden Geschlechtern die Extreme 5 und 20 cm sind. Simons Ansicht, daß die vitale Capacität um 19 ccm auf $2\frac{1}{2}$ cm Zunahme des Brustumfang steige, hält er für weniger richtig, weil sie auf eine geringere Zahl von Beobachtungen sich stütze.

Der Werth, den auch alle bisherigen Beobachter auf die

Brustbeweglichkeit im Verhältniß zur AthemgröÙe legen wird auch von Arnold bestätigt. Indem er bei dieser Gelegenheit auf Grund wiederholter Versuche an Thieren und Menschen Hutchinsons Ansicht, als ob bei tiefer Inspiration das Zwerchfell weniger in Betracht komme, widerlegt, bezeichnet er die regio cardiaca als den geeignetsten Punkt, um die doppelseitige Ausdehnung des Brustkorbes nach unten und nach den Seiten zu messen, indem dessen Lageveränderung sowohl von dem Abwärtssteigen des Zwerchfelles als von der Hebung der Rippen abhängig ist. Aus einer Betrachtung der von Simon und Fabius angegebenen Fälle ergibt sich eine um so regelmäÙigere Steigerung der Vitalcapacität, je gröÙer die Anzahl der beobachteten Fälle ist. Für $\frac{1}{2}$ cm Zunahme in der Brustbeweglichkeit ergibt sich annäherungsweise eine Steigerung von 80 ccm. Die Zunahme der Beweglichkeit mit der Zunahme des Brustumfanges stellt sich im Ganzen als eine geringe und keine regelmäÙige dar, während sie mit der Höhe eine ziemlich regelmäÙige Steigerung erkennen läÙt, indem sie von 157 cm Höhe und im Mittel 6,5 cm Beweglichkeit bei je 5 cm Höhensteigerung etwa 0,5 cm vermehrte Beweglichkeit erfährt, eine Thatfache, die darin ihre Erklärung findet, daÙ der Abstand der Rippen von einander bei hohen Personen beträchtlicher ist als bei niederen, daÙ dagegen bei verschiedenem Brustumfang und gleicher Höhe die Intercosträume keine oder nur geringe Unterschiede in ihrer Breite erkennen lassen. Nach dem Abstände der Intercosträume richtet sich ceteris paribus die Beweglichkeit. Da jedoch nach dem Cubikinhalte eines Cylinders sich auch der relative Werth der Beweglichkeit bemist, so läÙt sich a priori auch annehmen, daÙ ein Brustkasten von 80 cm Umfang und 1 cm Beweglichkeit auch mehr Luft aufnehmen muß, als einer von 70 cm Umfang und der gleichen Beweglichkeit. Aus einer Vergleichung der Fälle in dieser Richtung zieht Arnold den Schluß, daÙ bei 70 cm Brustumfang der Werth

für 1 cm Beweglichkeit 140 ccm mit einer Steigung von je 4 cm für 1 cm Brustumfang von 70—80 cm beträgt, bei der Steigung von 80 auf 90 cm Umfang der Werth für 1 cm Umfang sich je um 6 ccm erhöht. Da nun bei bestimmter Körperhöhe die Beweglichkeit eine mittlere Gröfse besitzt, z. B. bei 161—170 cm Höhe 7 cm und da der Werth der Beweglichkeit für 1 cm mit dem Brustumfange zunimmt, indem er z. B. bei 80 cm Umfang 180 ccm und bei 85 cm Umfang 210 ccm beträgt, so mufs dementsprechend bei der Bestimmung der physiologischen Athmungsgröfse, je nachdem die Beweglichkeit der Brust im Verhältnifs zur Höhe unter oder über dem Mittel steht, ein dem Toraxumfang entsprechender Abzug oder Zusatz gemacht werden.

Ein Mann von 166 cm Höhe und 80 cm Brustumfang hat gemäfs der Höhe und Circumferenz ein physiologisches Mittel von 3420 ccm. Seine normale Beweglichkeit beträgt 7 cm. Würde sie nun 6 oder 9 betragen, so wäre dementsprechend im ersten Falle 180 ccm abzuziehen, im zweiten noch hinzuzufügen. Um den Einflufs des Alters genauer zu untersuchen, nimmt Arnold die Tafeln Hutchinsons, des Einzigen, der in dieser Hinsicht gröfsere Beobachtungen angestellt, zu Hilfe und stellt, indem er sich im Allgemeinen der Ansicht Hutchinsons (siehe oben) vollkommen anschliesst, folgendes ungefähre Progressionsverhältnifs auf, wobei er aber einräumt, dafs diese Zahlen nur einen approximativen Werth besitzen und durch umfangreichere Untersuchungen erst bestätigt oder widerlegt werden müfsen, demgemäfs nun würde die Vitalcapacität von 15—25 Jahren jährlich um etwa 32 ccm

„ 25—35	„	„	„	3	„ steigen
„ 35—40	„	„	„	120	„ (im Ganzen)
„ 40—45	„	„	„	140	„
„ 45—50	„	„	„	290	„
„ 50—55	„	„	„	120	„
„ 55—60	„	„	„	130	„
„ 60—65	„	„	„	120	„ sinken.

In der Periode von 45—50 Jahre würde also eine jähr-

liche Abnahme von 58ccm stattfinden, während sonst die Abnahme ziemlich gleichförmig erfolge.

Die Körperhöhe scheint auf das Steigen und Fallen der Athmungsgröfse in den verschiedenen Altersperioden keinen Einfluß zu haben. Die Abnahme der Vitalcapacität im höheren Alter kann ihren Grund nicht in einer Abnahme des Brustumfanges haben, da dieser viel eher, wie Hutchinsfons Tabelle zeigt, vom 40 Jahre zunimmt, wohl aber kann möglicherweise eine verminderte Brustbeweglichkeit dazu beitragen; ohne dafs jedoch ihr Antheil bis jetzt bestimmt werden kann.

Das von seinen Vorgängern gelieferte und von ihm selbst untersuchte Material stellte Arnold hinsichtlich ihrer Beschäftigungsweise zusammen und fand dadurch, dafs sich etwa 3 Hauptklassen feststellen liefsen, deren erste die Seefoldaten, Seelente und Rekruten, deren zweite die Polizei, Schriftsetzer und Handwerksleute, deren dritte die Armee, Standesperfonen und Studirenden bilden. Bei Bestimmung der normalen Vitalcapacität mufste man nach Arnold's Berechnung bei der 1. Classe 300ccm, bei der 2. Classe 100 ccm mehr, bei der 3. Classe 100ccm weniger annehmen als das für eine bestimmte Höhe erhaltene Mittel angibt. Die niedere Athmungsgröfse bei Standesperfonen und Studenten erklärt Arnold durch die geringe Uebung der Athmungsbewegungen bei der sitzenden Lebensweise, während die Höhe durch den steten Aufenthalt im Freien hervorgerufen wird. Es ist somit unbestreitbar, dafs der Aufenthalt im Freien und besonders in der Seeluft sehr günstig auf die Athmefunktionen wirkt, dafs dagegen alle Beschäftigungen, die eine sitzende Lebensweise zur Folge haben, nachtheilig auf die Athmungsorgane wirken. Bemerkenswerth ist hierbei ferner, dafs bei der Inanition nicht blofs die Athembewegungen in ihrer Häufigkeit abnehmen und am 3. Tage sich schon um $\frac{2}{5}$ sich vermindert zeigen, sondern dafs auch in der Menge der respirirten Kohlensäure und des aufgenommenen Sauerstoffes eine rasche Abnahme stattfindet

Die Uebung der Athemmuskeln hat nach Arnold nur dann einen günstigen Einfluß auf die Vitalcapacität, wenn damit keine zu häufige, zu lange dauernde Anstrengung der Respirationsorgane verbunden ist, denn durch das Zurückhalten der Luft bei angestrebtem Singen und Blasen, bei Lastträgern und bei raschem Bergsteigen wird Emphysem erzeugt, wie auch Fabius an Turnern meist eine zu niedrige Vitalcapacität fand. Wohl mag Fabius die ansehnliche Muskulatur dabei nicht genügend in Abrechnung gebracht haben.

Arnold ist der Ansicht, daß ein vernunftmäßiges Turnen, soferne die Athmungsorgane nicht zu sehr dabei angestrengt werden, gewiss keine nachtheilige Wirkung auf die Vitalcapacität habe. Günstiger als das Turnen scheine allerdings das Singen und Flötenspielen, Lothröhrblasen und selbst das Trompetenblasen zu wirken, wofür wenigstens einige von Arnold und Fabius mitgetheilten Beobachtungen sprechen.

Ueber den Einfluß einer veränderten Stelle und Lage des Körpers, den schon Hutchinson an sich beobachtet hatte, indem er stehend 4264 ccm, sitzend 4182 ccm, auf dem Rücken liegend 3772 ccm, und auf dem Bauche liegend 3608 ccm ausathmete, scheint Arnold eigene Untersuchungen nicht gemacht zu haben und schließt sich Wintreichs oben erwähnter Ansicht an, daß bei muskelkräftigen Individuen der Unterschied wohl sehr klein sei und fast ganz verschwinde. Auch die Beobachtung von Hutchinson, Albers und Anderen, daß nach reichlicher Mahlzeit durch Magenanfüllung das vitale Athmungsvermögen vermindert werde, bestätigt er, ebenso wie die bezüglich der Anfüllung des Colon und Rectums, wobei allerdings bei mäßiger Fülle keine oder nur eine minimale Verminderung eintrat.

Eine besondere Wichtigkeit mißt Arnold auch der Athemfrequenz sowie dem Luftdrucke bei, ohne jedoch hier über selbst neue Versuche angestellt zu haben.

Eine bestimmte Angabe über den Werth der Muskelkraft für die Athmungsgröfse hält er gegenwärtig noch nicht für möglich, da noch keine umfassenden Beobachtungen hierüber unter sonst ganz gleichen Faktoren vorliegen. Im Allgemeinen ergibt sich nach der Zusammenstellung von Hutchinson, dafs die Kraft der Inspiratoren am beträchtlichsten bei einer Höhe von 169,5—172 cm ist und von da an stufenweise abnimmt wie die Höhe wächst, so dafs die 169,5—72 cm hohen Männer eine Quecksilberfäule um 75 mm im Mittel erheben, die 182 cm hohen Individuen sie nur gegen 62 mm heben. Die Kraft der Ausathmung dagegen ist im Allgemeinen bei kleinen Personen geringer als bei grofsen, sie nimmt von 80 mm bei 152—160 cm hohen bis 112 mm bei 182 cm hohen Männern zu. Mit obiger Bemerkung über die Einathmungskraft steht auch die Beobachtung in Einklang, dafs bei sehr hohen und schwächlichen Personen eine geringere Einathmungskraft mit einer im Verhältnifs zur Höhe, dem Brustumfange und dem Alter zu niederen Vitalcapacität Hand in Hand geht.

Auch die Frage bezüglich des Einflusses des Geschlechtes beziehungsweise die physiologische Athmungsgröfse des Weibes hält Arnold erst in der Zukunft für lösbar, da bis jetzt eine zu geringe Zahl von Beobachtungen vorliegt und diese selbst nur ungenügende Angaben enthalten. Der Einzige, der eine gröfsere Anzahl Weiber (550) untersuchte, hat seine Tabellen nicht veröffentlicht. Als ungefähren Schluss aus 116 zusammengeestellten Fällen glaubt Arnold Folgendes annehmen zu dürfen:

Es findet wahrscheinlich beim Weibe ebenso sehr wie beim Manne ein bestimmtes Progressionsverhältnifs statt und zwar mit jedem cm Steigung in der Körperhöhe wie im Brustumfang um circa 40 ccm Zunahme in der Athmungsgröfse. Die Athmungsgröfse des Weibes ist sowohl im Verhältnifs zur Höhe als zum Brustumfang niedriger als die

des Mannes, so daß ein Mann von 154 cm Höhe und 78 cm Umfang im Mittel eine Vitalcapacität von 3000 ccm, ein Weib von gleicher Höhe und Umfang nur von 2290 ccm besitzt. Nur ausnahmsweise erreicht die weibliche Athmungsgröße den Werth der männlichen oder nähert sich dieser. Nach Arnold erklären sich die Unterschiede der männlichen und weiblichen Capacität theilweise wenigstens daraus, daß erstens beim Weibe die Höhe des Brustkastens im Verhältniß zur Gesamthöhe des Körpers und zweitens der innere Umfang der Brusthöhle im Verhältniß zum äußern um etwa 5 cm kleiner ist als beim Manne, (was freilich nur 200 ccm ausmacht). Vor Allem aber übt die geringere Brustbeweglichkeit beim Weibe, mitverschuldet durch das Tragen enger Kleidungsstücke, Corsetten etc. durch die Beschäftigungsweise und durch die geringere Uebung der Athmungsmuskeln einen wesentlichen Einfluß aus. Während nämlich beim Manne die Beweglichkeit zwischen 3—12 cm schwankt und im Mittel 7,3 cm beträgt, haben wir beim Weibe nur eine Differenz von 1—7,5 cm und im Mittel 3,3. Nimmt man den Werth für 1 cm Beweglichkeit bei 87—88 cm Umfang nur zu 150 ccm, so ergibt sich hieraus ein Minderbetrag der Vitalcapacität von 500 ccm.

Bezüglich des Alters herrschen wahrscheinlich beim Weibe gleiche Verhältnisse wie beim Manne.

Auch nach Arnold hat die Schwangerschaft keinen bestimmt nachweisbaren Einfluß auf die Athmungsgröße, wahrscheinlich deshalb, weil die Ausdehnung der Athmungshöhle beim Weibe vorwiegend im oberen Abschnitte stattfindet und daher durch die Schwangerschaft nicht alterirt werde und weil der gerade und quere Durchmesser der Brustbasis vergrößert und dadurch das Minus im Längendurchmesser compensirt werde.

Nach einer längeren Ruhepause war C. W. Müller der erste, der sich wieder eingehender mit Spirometrie befaßte und wie wir

sehen werden, weit andere Grundätze behufs Berechnung der physiologischen Vitalcapacität aufstellt. Nachdem er die Unmöglichkeit durch das Volumen oder Gewicht des ganzen Körpers eine Beziehung zur Athmungsgröfse ermitteln zu wollen erörtert, insoferne diese Bestimmung theils zu complicirt ist, theils die Proportion sich häufig aus einer positiven in eine negative verwandelt, verwirft er auch die bisher übliche Bestimmung nach der Körpergröfse als praktisch unbrauchbar und zu unsicher, indem er auch bei Gefunden keine regelmäßige Proportion zwischen Lunge und Körperhöhe anerkennt. Für viel enger hält er die Beziehung des Lungenraumes zu dem Theil des Körpers, der aufer der Lunge noch andere dem negativen Leben dienende Theile einschließt. Demgemäfs nun ignorirt Müller bei seinen Fällen die Körperlänge ganz und nimmt nur auf den Rumpf Rücksicht, der ihm allein in einer wirklich konstanten Beziehung zum Lungenraum zu stehen schien. Hat Arnold für den Rumpf, Hutchinson für den Brustumfang keine regelmäßige Proportion auffinden können, so sucht Müller den Grund hiefür darin, dafs sie immer nur einen einzelnen Durchmesser des Lungenraumes berücksichtigt hätten, die unter sich nicht in einer festen Proportion ständen, sondern oft gegenseitig compensirend auftreten. Die Lungencapacität, sagt Müller, ist eine im Cubikmaafs ausgedrückte Gröfse und stellt einen bestimmten Theil vom Cubikinhalte des Rumpfes dar. In ähnlicher Weise hat sich, wie wir gesehen, früher Fabius ausgesprochen. Wird nun der Rumpf als ein Cylinder betrachtet, dessen Endflächen durch den mittleren Thoraxumfang durch die Länge der Wirbelsäule und dessen Höhe repräsentirt werden, so treten die Gesetze ein 1) dafs Cylinder nach der Höhe nur bei Gleichheit der Grundflächen (hier des Thoraxumfanges) verglichen werden dürfen, ferner 2) dafs ihr Inhalt $r^2\pi h$ bei Gleichheit der Höhen sich verhält wie die Durchschnittskreise oder die Quadrate der Radien oder die Quadrate der Durchmesser, dafs es

aber falsch ist, sie auch bei vorhandener Gleichheit der Höhen einfach nach deren Umfange zu vergleichen, endlich 3) verhalten sich 2 Cylinderinhalte nur dann wie die Rumpfoberflächen ($p \times h$) wenn die Radien und natürlich auch die Umfänge gleich sind. Damit nun, sagt Müller, glaubt er auch alle bisher aufgestellten Gesetze über die Beziehung der Lungencapacität zu irgend einem einzelnen Körpermaße widerlegt zu haben.

Aus dem oben erwähnten 1. Satze nun, daß Lungencapacitäten (bezw. Cylinder) nur bei Gleichheit der Rumpfumfänge sich verhalten wie die Rumpfhöhen, gehe, da die Rumpfumfänge aller Menschen nicht gleich sind, hervor, daß auch Arnold kein Gesetz über den Einfluß der Rumpfhöhen finden konnte und ebenso das Gesetz über die Körperlänge viele Widersprüche enthalte. Aus dem 2. Satze aber erkläre sich, daß Hutchinson, der statt dem Quadrate der Durchmesser einfach den Brustumfang also die Peripherie setzte, hiemit zu keinen positiven Resultaten gelangen konnte. Der 3. Satz endlich läßt sich insofern verwerthen, als bei gleichen Oberflächen von einem hohen schmalen Rumpf eine geringere Lungencapacität zu erwarten steht, als von einem kurzen breiten.

Um nun den Cubikinhalt des Rumpfes zu bestimmen, mißt Müller die Höhe des Cylinders vom oberen Ende des Process. spin. des 7. Halswirbels bis zum untern Ende des Steißbeins, um die Peripherie zu bestimmen, wählt er die am wenigsten von Weichtheilen umgebene Stelle des Thorax beim Manne etwa 2 Finger breit unter der Brustwarze, indem er durch sie einen horizontalen Kreis legt, der über die Basis des Schwertfortsatzes zieht und hinten etwa 3 Querfinger von der untern Ecke der Skapula entfernt bleibt. Beim Weibe wird das Meßband durch die Mamma etwas hinabgedrückt, doch eine dadurch entstehende Differenz durch den daselbst reichlicheren Paniculus adiposus ausgeglichen. Beim Entnehmen des Höhenmaßes läßt man den Bauch etwas einziehen (oder

drückt ihn leicht ein), so daß der Bogen der Lendenwirbelsäule verschwindet und das Maß überall aufliegt, dabei darf der Rücken nicht mehr als nöthig gekrümmt sein. Unter mehreren Process. prominent. macht sich der des 7. Halswirbels durch ein dickeres knaufförmiges Ende kenntlich, unter dreien ist der Mittlere. Beim Steißbein muß der Finger das Maß unter die Spitze desselben leiten. Beim Messen des Thoraxumfanges hat man vor Allem darauf zu achten, daß die durch das Centimetermaß bezeichnete Horizontalebene auch wirklich senkrecht den von der Vertikalen nach hinten reichenden Thorax durchschneidet. Geht das Maß hinten zu tief hinunter, so erhält man eine zu kleine Zahl, steht es zu hoch rückwärts, so wird ein zu großer Umfang gemessen. Hängende Brüste müssen in die Höhe gehoben werden, die Arme müssen dabei herabhängen und der Betreffende darf nicht mit einer Soldatenbrust dastehen.

Am besten nun erachtet Müller, um den Cylinderinhalt beziehungsweise den Rumpf zu berechnen, die Formel

$$R = \frac{r}{2} p h.$$

in der R den Rumpfinhalt, h die Rumpfhöhe, p den Thoraxumfang und r den zu diesem p gehörigen Radius bezeichnet, da p und h direkt durch die Messung gegeben sind, so ist nur noch $\frac{r}{2}$ aus p zu berechnen nach der Formel

$$p = 2 r \pi \text{ also } \frac{r}{2} = \frac{p}{4 \pi}$$

und da die Ludolfine π bekannt ist

$$\frac{r}{2} = \frac{p}{12,5664}.$$

Bezeichnet nun L die durch das Spirometer gefundene Lungen-capacität, so gibt

$$\frac{R}{L} = \frac{r}{2} \frac{p h}{L}$$

das Verhältniß zwischen Rumpfinhalt und der gefundenen Lungencapacität an.

$\frac{R}{L}$ ward von Müller der Lungencapacitätsquotient genannt und ward derselbe somit gefunden, wenn Rumpfhöhe und Thoraxumfang multiplicirt und das erhaltene Produkt durch die gefundene Lungencapacität dividirt und mit dem halben Radius multiplicirt wird. Den Faktor $\frac{r}{2}$ kann man sich ein für alle Male für die am menschlichen Thorax vorkommenden Umfangmasse ausrechnen, der andere Faktor $\frac{p h}{L}$ ist dann sehr schnell berechnet, so daß die Rechnung für sich nach Müller nur 1—2 Minuten beansprucht.

In 129 Fällen, die Müller nun in einem sehr gesund gelegenen Dorfe, in dem Tuberculose nicht vorkommen soll und die also das Portotyp einer gefundenen Lunge bieten, zeigt sich der Lungencapacitätsquotient zwischen 6,0 und 7,6 (genauer zwischen 5,9 und 7,58) schwankend. Je kleiner natürlich der Quotient, um so größer ist die vitale Capacität. Die Fälle selbst rekrutiren sich aus männlichen Individuen von 4—47 Jahren, und aus weiblichen bis 24 Jahren. Der Durchschnittsquotient sämtlicher Fälle nach Abzug der 14 Kinder

ist 6,94

der 66 männl. Individuen 6,98

der 49 weibl. Individuen 6,89.

Müller hält den Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Individuen für rein zufällig, zudem Messungsfehler von 1—1½ cm. leicht vorkommen können, denn vergleicht man andererseits z. B. 17 Fälle der männlichen Individuen vom 17. Jahre an mit 19 weiblichen vom 15. Jahre an, so ergibt sich für die Männer ein Mittel von 6,91, für die Mädchen von 6,90.

Der normale Capacitätsquotient schwankt zwischen den Grenzen von 6,0 und 7,6 und beträgt im Mittel 7,00.

Dem Lebensalter gesteht Müller einen Einfluss auf den Quotienten nur soweit zu als 1) mit zunehmenden Jahren die Masse größer werden und 2) auch der Versuch am Spirometer zuweilen geschickter ausgeführt werden mag, welch' letzterer Umstand aber als rein zufällig außer Acht gelassen werden kann.

Die Grenzen der Masse für die Rumpfhöhen schwanken in allen von Müller untersuchten Fällen zwischen 32 und 69 cm., haben also eine Spielweite von 36 cm., während der Brustumfang zwischen 46 und 89 cm. spielt und somit eine Grenzweite von 43 cm hat.

Zwischen Rumpf und Umfang findet nun natürlich ein gewisses Verhältniß statt und schwankt, wie sich aus der Tabelle zeigt, die Differenz bei Peripherien von 46—70 cm. zwischen 7—10—20, wobei die kleineren Differenzen vorzüglich von den Weibern repräsentirt werden, bei Peripherien von 70 bis 90 cm. kann die Rumpfhöhe um 12—29 cm. kleiner sein als der Umfang (meist aber über 15 cm.) Trotz dieser Schwankungen können die Capacitätsquotienten bis auf 0,01 gleich sein und müssen bei gefunden Individuen die oben bestimmten Grenzen einhalten. Doch schließt Müller gerade aus ihnen die Verkehrtheit nach einzelnen Massen eine Regel aufstellen zu wollen, was nur berechtigt wäre, wenn alle Menschen die vom Schönheitsideal geforderte gleiche Proportion einhielten.

Was den Typus beider Geschlechter anlangt, so erklärt Müller auf Grund seiner gefundenen Masse, daß der Rumpf des Weibes im Verhältniß zum Brustumfang länger, als beim Manne ist und die Combination zwischen Thoraxumfang und Rumpfhöhe eine geringere Differenz beider Masse zeigt, nämlich höchstens 18 cm., beim Manne aber bis 29 cm. Freilich zeigten einzelne Männweiber davon eine Ausnahme. Andererseits mögen die Damen höherer Stände noch geringere Differenzen

aufweisen, wenn nicht krankhafte Fettablagerung etwa vorhanden ist.

Trotz dieser Verschiedenheiten können nun, wie schon oben erwähnt, die Capacitätsquotienten genau übereinstimmen und Müller betrachtet es also als ein „theoretisches Vorurtheil“, dem weiblichen als dem schwächeren Geschlechte auch eine geringere Lungencapacität zuzutheilen. Wollte man ein Gesetz betr. des Geschlechtes auf Ein Mafs begründen, so müßten die andern Mafse also etwa Höhe oder Umfang gleich sein.

Bei feinen Versuchen will Müller eine gewisse UeberEinstimmung in dem Quotienten bei den Gliedern einiger Familien bemerkt haben, besonders wenn das Alter mit in Rechnung kommt und ein Quotient von 7,2 bei einem 7jähr. Kinde dem von 6,49 bei einem 19jähr. Individuum gleichbedeutend betrachtet wird. Bei 33 Familien zeigte sich nur ein Schwanken (mit obiger Zugutrechnung des Alters) von 0,7 während normaler Weise die Unterschiede 1,6 betragen dürfen.

Müller schließt daraus, dafs ein gewisser gemeinsamer Einfluß die einzelnen Quotienten einer Familie als eine erbliche Eigenthümlichkeit beeinflusst, in ähnlicher Weise wie Farbe der Pupillen, der Haare etc. und andererseits manche Krankheiten als constitutionelle Eigenschaften sich vererben. Hiebei führt er als interessante Thatfache an, dafs die Lungencapacität der Engländer um mehr als $\frac{1}{7}$ gröfser ist, als die der Deutschen. Während in allen Staaten des Continentes seit Ende des vorigen Jahrhunderts das Militärmafs mehr (theilweise auf $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{9}$) heruntergesetzt worden sei, habe England das Mafs von 176,8 cm. beibehalten, was 20 cm. mehr als bei uns betrage.

Er erblickt darin ein Symptom einer seit 80 Jahren sich geltend machenden Degeneration, welche mit der Einführung des Kartoffel- und Futterbaues auf Kosten der Leguminosen und des Getreides und hiedurch eingetretenen Mangel an

Phosphaten in der Nahrung zusammenfalle, von dem die Engländer, die die Knochenerde aus aller Welt nach ihrem Boden zusammenführten, verschont geblieben seien. Der Quotient $\left(\frac{R}{L}\right)$ werde übrigens, da alle Theile gleichmäfsig entwickelter sind, trotzdem der gleiche sein, wie bei uns. Einen gewichtigen Einfluß schreibt Müller der chemischen Beschaffenheit der Luft auf das Vitalvermögen zu und fand er an 18 Fällen, die er in der Stadt Wiesbaden „von der Strafsse aufgriff“ und untersuchte, darunter elf Knaben unter 15 Jahren, eine Grenzweite der normalen Quotienten zwischen 7,2 und 8,8, somit um 1,2 gegen die auf dem Lande verschoben. Er vermuthet daher, dafs in verschiedenen Gegenden mit verschiedener Luftbeschaffenheit auch die Capacitätsquotienten differiren. Wiederholt machte er auch die Beobachtung, dafs die Capacität nach einem Gange in freier Luft um 50 ccm. zugenommen habe.

Während Müller 3 Individuen je 700 mal in gewöhnlicher Luft in den Spirometer athmen liefs, erfolgte bei dem ersten nur eine Zunahme von 225 ccm., bei dem zweiten von 400 ccm. und bei dem dritten von 200 ccm., nach mehreren Sitzungen aber in comprimierter Luft zeigte sich beim Athmen mehrere Tage nach der letzten Sitzung eine weitere Steigerung und zwar bei dem ersten Individuum nach 17 Sitzungen um 500, bei dem zweiten nach der 16. Sitzung um 550 und bei dem dritten nach der 5. Sitzung um 400 ccm. Die comprimerte Luft in den Sitzungen betrug ca. $1\frac{1}{5}$ — $1\frac{2}{5}$ Atmosphärendruck. Diese Vermehrung soll, wie auch andere Beobachter bestätigen, Dauer haben oder wenigstens für längere Zeit anhalten, und nachwirken, wenn eine genügende Anzahl Sitzungen (etwa 30—40) genommen worden. Die durch die Stadtluft verdorbenen Capacitäten könnten hiedurch bald wieder ihr Maximum erreichen. Für die ganze Untersuchung betrachtet Müller noch folgende Momente für beachtenswerth:

Die Ungeschicklichkeit werde nur selten den Versuch stören.

In's Gewicht falle der Zustand der Gesamtconstitution, Heredität, Disposition oder angeborene Schwäche des Organismus sei gebührend in Rechnung zu bringen. Bei höherem Alter sei zu erwägen, ob eine Herabsetzung des Quotienten auf Kosten der Atrophie zu schreiben sei; Berücksichtigung der Luft (Stadt, Land, Zimmer oder Freien), in der das Individuum seit längerer Zeit gelebt hat;

endlich Geschäft und Handwerk, soweit es sich um die Beschaffenheit der Luft des Arbeitslokales oder um Behinderung der Respirationsbewegungen handelt. Jedes dieser Momente kann nach Müller einen verdächtigen Quotienten hervorrufen und bei Zusammenwirken sogar den Beginn einer Lungenkrankheit andeuten.

Eine Untersuchung der Fehlergrenzen beim Messen zeigt Folgendes: 1) der Fehler ist bei größeren Capacitäten von geringerem Belang als bei kleineren, 2) kommt er auch bei normalen wenig in Betracht. Bei normalgroßen Capacitäten kann man im Mittel für einen Fehler von 1 cm. Umfang 0,18 für 1 cm. Höhe 0,12 bei krankhaft kleinen im ersten Falle 0,24 im letzteren 0,14 als Differenz am Capacitätsquotienten annehmen.

Bei einem Gesamtfehler von 2 cm also dort etwa 0,3 hier 0,38 bei 3 cm 0,45 resp. 0,55. So könnte ein normaler Quotient nur verdächtig werden, wenn er die Grenzen der Norm streifte und die Maasse um 3 cm. zu groß gemessen wären. Umgekehrt könnte bei nur 3 cm zu kleinem Maasse ein krankhafter als verdächtig, ein verdächtiger als normal erscheinen. Möge daher in fraglichen Fällen zur Controle eine zweite Messung stattfinden.

Müller fand bei seinen Fällen zum größten Theil eine mittlere Muskulatur und Fettentwicklung. Nach der Formel $p = 2 r \pi = 6,28 r$ ergibt sich übrigens, daß jede Aenderung

um $\frac{1}{6}$ cm. in der Dicke der Weichtheile 1 cm. in der Peripherie ausmacht. Man müßte also bei ganz abgemagerten Individuen etwa 3—4 cm zuzählen und der von einem fetten Körper entnommenen Thoraxperipherie das Nöthige abziehen (etwa bis zu 6 cm.).

Dem Einwand, daß der paralytische Thorax eines Tuberkulösen und der faßförmige eines Emphysematikers soweit von der ursprünglichen Form sich entferne, daß das gefundene Maas nicht mehr als richtig angesehen werden könne, tritt Müller mit der Bemerkung entgegen, daß in solchen vorgeschrittenen Fällen die vitale Lungencapazität zur Sicherstellung der Diagnose überflüssig erscheint, will man sich aber nur einen Begriff von dem Grade in der Entwicklung des Leidens machen, so handelt es sich dabei um so enorm große Zahlen, (z. B. 19,24) daß jener Fehler in der Peripherie nicht mehr in Betracht kommt und dann genügt es ja auch zu wissen, daß der Quotient des Tuberkulösen noch ein zu günstiger, der des vorgeschrittenen Emphysematikers dagegen nicht so schlimm ist, wie ihn der Fehler des Maasses gemacht hat.

In neuester Zeit nun hat Waldenburg in seinem Werke über „die pneumatische Behandlung“ der Spirometrie einen längeren Artikel gewidmet.

Vor Allem macht er auf die Fehlerhaftigkeit des Instruments von Phebus, der durch größere Einfachheit den Spirometer von Hutchinson verdrängen sollte, aufmerksam und weist auf die bedeutenden Fehlerquellen hin, die dadurch, daß der innere Cylinder nicht aquilibriert sei, hervorgerufen würden. Er knüpft daran die Bemerkung, daß sein pneumatischer Apparat für den Spirometer einzutreten vermöge.

Bezüglich der Größe gibt Waldenburg den sorgfältigen Untersuchungen Arnolds den Vorzug zudem Wintrich seine Tabellen nicht veröffentlicht habe. Auch bezüglich des Brustumfanges schließt er sich Arnolds Ansicht an, bemerkt

aber dabei, daß er sie für die Diagnostik deshalb nicht verwerthbar halte, weil der Brustumfang von Personen, die an den Respirationsorganen leiden oder sogar nur disponirt sind, ein pathologischer Faktor sei und deshalb zu diagnostischen Zwecken ganz aus der Berechnung auszuschneiden sei.

Für besonders beachtenswerth hält er Müllers Untersuchungen, die er auch im Auszuge mittheilt. Dessen Methode nennt er die von allen vollkommenste, wobei er allerdings die Berechnung nach derselben für schwieriger anerkennt als die nach Arnolds Formel.

Wie dort rügt er auch hier den Mangel, daß der Brustumfang ein pathologischer Faktor in die Berechnung aufgenommen ist.

Bei einer Vergleichung des Müller'schen Quotienten gegenüber dem Schema der Vermehrung der Vitalcapacität einzig und allein nach der Körpergröße wie es Hutchinson Wintrich und namentlich Arnold aufstellt, spricht Waldenburg die Ansicht aus, daß Müllers Quotient physiologisch der mathematisch beste Ausdruck der individuellen Verhältnisse, wohingegen das nur nach der Körpergröße berechnete Schema der Vitalcapacität auf rein empirischem Wege gefunden worden sei und somit empirische Durchschnittswerthe angiebt.

Auch nach Waldenburgs Beobachtungen bestätigt sich, daß die Vitalcapacität beim Weibe auf ca. $\frac{2}{3}$ bis höchstens $\frac{3}{4}$ der beim Manne zu veranschlagen ist. Ueber das Alter schließt er sich der allgemein vertretenen Ansicht an, ebenso hinsichtlich des Standes und der Lebensweise.

Vorzüglich betont Waldenburg, daß Schmerzen im Unterleib oder in der Brust, welche eine tiefe In- und Expiration hindern, ein unbrauchbares Resultat hervorrufen. Soweit, wie wir im Obigen ausgeführt haben, gehen die Ansichten und Beobachtungen der bisherigen Autoren über die Mittel,

die Art und Weise der Bestimmung der physiologischen Vitalcapacität.

Die Ursache, daß unserm Gegenstande eine so vielfache Bearbeitung zu Theil, daß auf seine Erforschung so viel Zeit und Mühe schon verwendet wurde, lag vor Allem in der sicheren Erwartung, durch die gemachten, spirometrischen Beobachtungen die Diagnostik um ein nicht unerhebliches Mittel zu bereichern. Denn sind wir einerseits in der Lage, die einem bestimmten Menschen zukommende physiologische Vitalcapacität aus dessen individuellen Eigenschaften zu berechnen, wissen wir andererseits, daß durch die Krankheiten der Lungen und der benachbarten Theile, insoferne sie die Durchgängigkeit der Luftmenge oder die Aufnahme eines größeren Luftvolumens in die Lungen beeinträchtigen, die normale Vitalcapacität in verschiedenem Grade verändert oder vielmehr verkleinert wird, so sind wir natürlich berechtigt, aus einer der Berechnung nach zu kleinen Capacität, die wir bei einem Individuum finden, auch auf eine pathologische Veränderung in der Lunge oder deren Umgebung zu schließen, selbst wenn sonstige Anzeichen einer Krankheit fehlen.

Gerade dieser letzte Punkt ist das, worauf mehrere Beobachter das Hauptgewicht legen, insoferne sie Fälle gesehen haben mit relativ verminderter Vitalcapacität ohne daß zur Zeit der Untersuchung physikalisch irgend etwas pathologisches nachzuweisen gewesen wäre. Nach Verlauf von Monaten, selbst einem Jahre, seien solche Tuberkulose zu Grunde gegangen.

So theilt Hutchinson einen äußerst interessanten Fall mit, der den amerikanischen Preisfechter Freemann, „einen Riesen“ betrifft. Dieser Mann hat bei seiner ersten Untersuchung, als er noch vollkommen gesund war, eine Höhe von 209 cm., einen Brustumfang von 117,5 cm. und eine Athmungsgröße von 7118 ccm. Zwei Jahre später betrug seine Athmungsgröße nur mehr 5460 ccm., ohne daß von zwei in der Auscultation wohl erfahrenen Aerzten eine organische Lungenkrankheit

entdeckt werden konnte. Nicht ganz ein Jahr später ergab die Sektion eine ziemlich ausgebreitete Tuberkulose beider Lungen. Außer diesem berichtet Hutchinson noch einige Fälle, in denen die Auscultation erst Monate später im Stande war, die verminderte Vitalcapacität, die der Spirometer ergab, zu erklären. Andererseits kamen ihm auch Personen vor, die für phthisisch gehalten wurden, während der Spirometer normale Capacität anzeigte und deren späteres Wohlbefinden das Ergebniss des Spirometers gerechtfertigt hat.

Nach den Beobachtungen Hutchinsons betrug nun die Abnahme im Verhältniss zu der nur nach der Grösse berechneten physiologischen Vitalcapacität in Fällen eines frühen phthisischen Stadiums von 361 bis 1804 ccm., im vorgerückten Stadium 1034 bis 3476 ccm. Der Verlust demnach das Mittel als richtig vorausgesetzt, im ersten Falle $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{2}$, im letzteren Fällen $\frac{1}{2}$ — $\frac{6}{7}$ des physiologischen Werthes.

Auch Simon macht in ähnlichem Sinne Mittheilung über 7 Fälle von Tuberkulose mit bedeutend herabgesetzter Vitalcapacität. Vor Allem hält er die Spirometrie wichtig für die Diagnose einer sich entwickelnden Miliartuberkulose, denn es zeigt dieselbe in diesen Fällen eine so bedeutende Abnahme, dass über den pathologischen Zustand des Untersuchten kein Zweifel mehr herrschen kann. Simon theilt übrigens auch einen Fall mit Dämpfung links oben mit, während die Respirationsgrösse nur 200 ccm. weniger als normal betrug.

Die von Fabius an den Nachkommen phthisischer Eltern angestellten Versuche ergaben mit wenig Ausnahmen in 9 Fällen eine viel zu kleine Vitalcapacität. Sieben davon glauben sich der besten Gesundheit zu erfreuen. Gleiches wird auch von Wintrich bestätigt, der wie Schneevogl nur nach Alter und Grösse das Normalmaass bestimmt hat. Auch nach ihren Untersuchungen stellt sich der Einfluss der Tuberkulose auf die Lungencapacität als sehr mächtig heraus und ergibt sich, dass Personen, die trotz scheinbarer Gesundheit phthisisch

sind, ein vermindertes Athemvermögen zeigen, wie andererseits eine bedeutende vitale Capacität Gewissheit gibt, daß die Lungen eine hinreichende Luftmenge fassen können und somit keine Tuberculose besteht oder erst eine sehr geringe Ausdehnung hat, wenn auch sonst Verdacht auf Phthise vorhanden ist.

Tuberculose läßt sich nach Wintrich ausschließen, wenn, wie bei Catarrh, die Capacität nur etwa um $\frac{1}{6}$ des Normalen vermindert ist. Zeigt aber das Spirometer $\frac{1}{5}$ oder $\frac{1}{4}$ weniger und bestehen noch einige verdächtige Allgemeinerscheinungen, so sei auch ohne örtliche Zeichen die Diagnose einer tuberkulösen Dyskrasis gerechtfertigt. Beginnende, ausgebildete oder auch noch latente, hereditäre oder acquirirte Tuberculose zeige eine Abnahme zwischen 8 und 85 % des Normalmaßes. Arnold stellte die von Simon, Fabius und ihm beobachteten Fälle zusammen und zeigt sich bei 16 Personen mit evidenter Tuberculose, daß sie um $\frac{3}{5}$ — $\frac{1}{8}$ weniger athmen als ihr nach Höhe, Umfang und Beweglichkeit der Brust berechnetes Normal beträgt. Es schwankt somit die Abnahme der Athmungsgröße zwischen 12 und 60 %. (In den Beobachtungen bei Hutchinson zwischen 9 und 85 %.) In acht Fällen darunter steht die Brustbeweglichkeit um 0,5—3,5 unter dem Mittel.

Bei weiteren 10 auf Tuberculose suspekten Personen betrug die Abnahme $\frac{1}{8}$ — $\frac{2}{5}$ des Normalen, also zwischen 12 und 40 %, während bei Gefunden höchstens eine Differenz von 10— $\frac{1}{2}$ % vorkommt. Die Brustbeweglichkeit war in 3 Fällen um 1—2 cm vermindert.

Arnold schließt aus seiner Zusammenstellung und den Beobachtungen seiner Vorgänger, daß durch Tuberculose eine so bedeutende Verminderung der Vitalcapacität stattfindet, daß man die Existenz sowie die Ausbreitung meist mit Sicherheit zu erkennen vermag. Wie es aber Individuen gibt, deren Capacität mehr oder weniger bedeutend über dem

physiologischen Mittel steht, so kommen auch Fälle von Tuberculose vor, in welchen die AthmungsgröÙe wohl im Verhältniß zur früheren Capacität, nicht aber im Verhältniß zum physiologischen Mittel vermindert ist. Daher bedeutet jede verminderte Capacität einen pathologischen, nicht aber jede normale einen physiologischen Zustand der Lunge. Eine $\frac{1}{7}$ bis $\frac{2}{5}$ verminderte vitale Capacität läßt bei hereditär Belasteten Tuberculose ahnen.

Müller beobachtete bei feinem Quotienten durch Tuberculose ein Steigen auf 10—19 und sogar höher.

Waldenburg bestreitet auf Grund seiner Erfahrungen, daß die Vitalcapacität durch Phthisis mehr herabgesetzt werde, als durch andere Affektionen der Respirationsorgane als z. B. durch Bronchitis oder Emphysem. Aus einer geringen Abweichung könne man auch auf eine geringere Ausbreitung des pathologischen Processes schließen.

Nach Wintrich und Schneevogt beträgt aber bei Bronchitis die Abnahme höchstens 10—20%, bei einzelnen Exacerbationen um $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ vermindert.

Während einer acuten Pneumonie oder Pleuritis kann der Spirometer wegen Hustenreizes nicht angewandt werden, bei davon Genesenden wurden noch später von Simon, Fabius und Schneevogt theils ziemlich bedeutende Unterschiede beobachtet. Bei ErgüÙe in den einen Pleurasack sinkt nach Arnold's Anschauung die Vitalcapacität um $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$, in Folge von Pleuritis und Pneumonie $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{5}$. Müller leugnet den Einfluß der Pleuritis, wenn nicht sehr umfangreiche Verwachsungen stattgefunden haben.

Das Lungenemphysem soll nach Schneevogt und Wintrich die Vitalcapacität von 11—66% bezw. 20—60% herabsetzen, allein ihre Resultate sind insofern, als sie allein durch die Höhe das Normale festgesetzt haben, nicht absolut zuverlässig. Simon und Fabius beobachteten eine Abnahme von $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$.

Auch Asthma ruft eine Verminderung hervor, doch stieg die Vitalcapacität nach dem Gebrauch *R. lobeliae* infl. um mehrere Hundert ccm, durchschnittlich etwa eine Abnahme von 20--30%. Ferner findet eine kleine Verminderung durch einseitige Lähmung der Thoraxmuskeln und durch Herzleiden (Hypertrophien etc.) statt. Bei Scoliosen richtet sich die Verminderung der Vitalcapacität nach dem Grade der Verkrümmung. Selbstverständlich muß das Vitalvermögen auch durch krankhafte Zustände, die das Zwerchfell nach oben drängen oder dessen Herabsteigen hindern, eine Ascites, Leber- und Milzvergrößerung beeinträchtigt werden und zwar nach Wintrich etwa 8--50%, nach Arnold 10--30%. Allgemeine Körperschwäche sowie dyskrasische Zustände, Scrophulose, Kopfgrind besitzen nur einen geringen Einfluß auf das Vitalvermögen, wenn die Lungen nicht ergriffen sind.

Von mehreren Schriftstellern wird insbesondere die durch den Spirometer mögliche Controle der Wirkung des therapeutischen Eingreifens hochgehalten und auf den prognostischen Werth aufmerksam gemacht, insofern eine rasche Abnahme der Expirationsgröße auch ein rapides Fortschreiten der Krankheit bedeutet.

Hutchinson und mehrere seiner Nachfolger wie Wintrich u. A. empfehlen die Anwendung des Instrumentes auch bei Untersuchung Conscriptionspflichtiger sowie solcher Personen, die in eine Lebensversicherung eintreten wollen.

Im Vorstehenden haben wir die wesentlichsten Ansichten der bisherigen Beobachter kennen gelernt, und ich gehe nun zu meinen eigenen Versuchen über.

Vor Allem nun gilt es zur Feststellung der physiologischen Vitalcapacität aus dem Chaos vorhandener Hypothesen und Berechnungen, aus dem sich oft widersprechenden Zahlengewirre diejenigen zu wählen, die mir den meisten Anspruch auf Sicherheit des Resultates zu erheben schienen. Dazu

aber konnte ich mich nicht entschließen, von den zwei sich gegenüberstehenden Verfahren, die Vitalcapacität zu bestimmen, deren eines in Arnold einen warmen Verfechter, deren anderes in Müller seinen Schöpfer fand, einem den entschiedenen Vorzug einzuräumen. Denn zugegeben, daß der Weg, den Müller eingeschlagen, mathematisch unbefreitbar richtig ist und auf ganz richtigem Raifonnement beruht, so kann man doch die Resultate Hutchinson's, Arnold's und Anderer, die aus einer großen Reihe gefundener Zahlen die arithmetischen Mittel berechnen, nicht, wie Müller thut, jede Berechtigung abprechen und sie kurzweg ignoriren. Daher habe ich in meinen Tabellen beiden Richtungen Rechnung getragen und wünsche nur, dadurch zur Klärung der Situation etwas beitragen zu können.

Das Instrument, das ich zu meinen Versuchen in Anwendung zog, war das von Hutchinson construirte, dessen Einrichtung und Handhabung ich als bekannt voraussetze. Um dem Uebelstand, daß nach Gebrauch des Instrumentes der Wasserspiegel im äußeren Cylinder höher stehe als im innern, und daraus, wie schon Wintrich bemerkte, eine Fehlerquelle entstände, wenn es nicht bemerkt und regulirt werde, so brachte ich den inneren Blechcylinder mit einem Quecksilbermanometer in Verbindung und zog ihn bei ungleichmäßigem Stande beiden Quecksilberfüßen entsprechend in die Höhe. Das Wasser hat mit geringen Schwankungen eine Temperatur von 15° C., so daß eine Correktion durch Rechnung nicht nöthig erschien.

Die betreffende Person, die nun in Untersuchung kam, liefs ich erst alle beengenden Kleidungsstücke entfernen, Hosenträger abstreifen, Hofen, (den Frauen die Röcke) lockern, und forderte sie nun auf, vor den auf einem Tische stehenden Spirometer zu treten und das Mundstück in die Hand zu nehmen. Hinsichtlich des Mundstückes entschied ich mich für ein aus Horn gefertigtes, platt geschliffenes Röhrchen mit

nicht zu engem Lumen, da ich aus wiederholten Versuchen, die ich mit diesem und mit einer grossen Mundmaske nebst Kautschukeinfassung vorgenommen hatte, stets wahrnahm, dass letzteres viel mehr anstrengte, weniger constante Resultate gebe und ihr Gebrauch den untersuchten Personen unangenehmer fiel. Nachdem nun die betreffende Person möglichst aufrecht stehend ein paar Mal recht tief ein- und ausgeathmet hatte, liess ich sie nach einer möglichst tiefen Inspiration, das Mundstück zwischen die Lippen fassen, es fest umschliessen, um jedes Entschlüpfen von Luft, welches sich durch Pfeifen sofort kund gibt, zu vermeiden und nun langsam und kräftig, mit Aufwand der Muskelkraft in den Spirometer ausathmen. Nachdem ein derartiger Versuch etwa 3 Mal wiederholt war, wobei natürlich der Spirometer jedesmal auf seinen ursprünglichen Stand zurückgebracht wurde, war »die Sitzung« beendet. Derartige Sitzungen musste jede Person mehrere durchmachen, bis ein sich gleichbleibendes Resultat zu Stande kam. Ich bemerke gleich an dieser Stelle, dass ich dem von mehreren Seiten gegen die Spirometrie gemachten Einwand, als ob von Seite der untersuchten Personen eine besondere Uebung, Gewandtheit und Geschicklichkeit erforderlich sei, nicht beitreten kann, wenigstens habe ich bei meinen Versuchen nur einige alte Vertreterinnen des weiblichen Geschlechtes, welche auch sonst unter dem als gewöhnlich angenommenen geistigen Niveau standen, als unbrauchbar entlassen müssen. Empfehlenswerth fand ich übrigens zu rein spirometrischen Versuchen immer mehrere Personen zusammen zu nehmen, da das Interesse der Untersuchten dadurch geweckt wird, und jeder das Möglichste leistet, um die Andern zu übertreffen oder wenigstens zu erreichen. Bei jeder Sitzung trug ich das höchste geathmete Volumen als das Endresultat ein, da ich dies für richtiger hielt, als nach Wintrich das Mittel zu nehmen, insoferne das höchste Mass anzeigt, wie viel Platz in der Lunge vorhanden ist und die niedrigeren Masse fomit, da die Lunge innerhalb so kurzer

Zeit doch nicht ihre Durchgängigkeit ändert, als unvollkommen erscheinen.

Bei Entnahme der Körperhöhe liefs ich die Stiefel oder Schuhe ausziehen und mit geschlossenen Füfsen unter dem Mafsstabe stehen. Wenn ich auch bei meinen Berechnungen der Normalcap. das Gewicht nicht berücksichtigte, so verzeichnete ich es doch, um es für ev. spätere ausgedehntere Untersuchungen verwerthen zu können. Die Männer wog ich, nur mit einem Hemde bekleidet, die Frauen mit Hemd und leichtem Rocke nebst Strümpfen. *)

Puls und Respiration bestimmte ich erst in der zweiten Sitzung, da in der ersten die meisten Personen infolge der Neuheit des Versuches einige Aufregung zeigten.

Das Brustmafs nahm ich einerseits nach Arnold, indem ich ein gewöhnliches Centimetermafs in der Gegend der Brustwarzen horizontal um die Brust legte und das Ergebnifs notirte. Läßt man das Hemd an, so wäre etwa $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ cm. zu vergüten. Während nun das Band liegen bleibt, läßt man die Person recht kräftig ausathmen, merkt sich das Maafs und dann möglichst kräftig einathmen. Die Differenz zwischen dem Maximum und Minimum gibt dann die Beweglichkeit.

Andererseits wurde ich der Müller'schen Forderung gerecht. Dieser nämlich verwirft die durch die horizontale Mamillarlinie gelegte Peripherie, da sie beim männlichen Geschlechte schon so bedeutende Schwankungen zeige und beim Weibe gar unberechenbar sei, und wählt dafür eine etwas tiefer gelegene Stelle, die wir bereits oben sammt der Messmethode ausführlich erwähnt haben. Bei der gleichfalls früher beschriebenen Messung der Rumpfhöhe nach Müller, habe ich noch anzufügen, dafs ich dazu die Personen selbst sitzen liefs und dabei möglichst auf Geradhalten des Kopfes achtete,

*) Läßt man die Kleider an, so wäre nach Quetelet (sur l'homme) bei Männern $\frac{1}{18}$, bei Weibern $\frac{1}{24}$ des gefundenen Gewichtes abzurechnen.

widrigenfalls es Mefsfelder von 5—6 cm. gibt, wenn das Haupt nach vorne geneigt ist.

Neben dem Stande, dem Alter und Geschlechte der Person sowie einer eventuellen hereditären Belastung, sowie dem gegenwärtigen Gesundheitszustande, notirte ich auch die Entwicklung der Muskulatur sowie des Fettpolsters und die bei jeder Untersuchung vorhandene Magen- und Darmfüllung. Damit glaube ich fast alle für die Spirometrie wichtigen Punkte zu erschöpfen. Von einer Prüfung mit dem Pneumatometer, die ich anfangs in das Bereich meiner Versuche zu ziehen beabsichtigte, mußte ich aus verschiedenen Gründen absehen.

Waren nun obige Fragen ermittelt, so galt es, die physiologische Vitalcapazität des betr. Individuums aus den gewonnenen Maßen festzusetzen. Indem ich hierin meist fast durchweg ihrer Klarheit und relat. Einfachheit halber den Arnold'schen Angaben folgte, nahm ich was Höhe und Brustumfang anlangte, eine Zunahme von jedesmal 150 cm. für je $2\frac{1}{2}$ cm. Höhe und Brustumfang an, da mir diese Steigung aus der Anzahl der vorgeschlagenen die der Wahrheit am nächsten kommenden zu sein scheinen, zudem auch die zahlreichen Untersuchungen Hutchinsons, was die Höhe betr., einer derartigen Progression sehr nahe stehen.

Wintrichs Resultate konnten deshalb weniger verwertet werden, weil er, wie schon früher bemerkt, leider keine Untersuchungstabellen veröffentlicht hat.

Nach den Versuchen von Simon, Fabius und Arnold kann der Einfluß des Brustumfanges wohl nicht mehr in Frage gestellt werden. Um nun eine längere Rechnung über das der Höhe und dem Umfang entsprechende Mittel zu ersparen, fertigte Arnold zwei Tabellen an, deren Schema wir hier mittheilen:

I. Werthtabelle der physiol. Vitalcapacität des Mannes im Verhältniss zur Höhe und Brustumfang.

Körper- höhe	B r u s t u m f a n g in cm.							100
	65	66	67	68	69	70	— — — —	
	ccm	ccm	ccm	ccm	ccm	ccm		ccm
154	2610	2640	2670	2700	2730	2760	— — — —	3660
155	2640	2670	2700	—	—	—	— — — —	3690
156	2670	2700	2730	—	—	—	— — — —	3720
157	2700	2730	—	—	—	—		
158	2730	2760	—					
—	—	—						
—	—	—						
—								
—								
—								
190	3690	—	—	—	—	—	— — — —	4740
191	3720	—	—	—	—	—	— — — —	4770

II. Werthtabelle für die physiol. Vitalcapacität des Weibes im Verhältniss zur Höhe und Brustumfang.

Körper- höhe	B r u s t u m f a n g in cm					100
	68	69	70	71		
	ccm	ccm	ccm	ccm		ccm
140	1810	1830	1850	1870		2450
141	1830	1850	—	—		2470
142	1850	1870	—	—		—
143	1870	—	—	—		—
—	—	—	—	—		—
—	—	—	—	—		—
—						
171	2430	—	—	—		3070

Den Brustumfang zog ich erst in Rechnung, nachdem ich bei sehr mageren und muskelschwachen Männern, wie Arnold vorgeschlagen, 5 cm. addirte, im entgegengesetzten Falle bei überreicher Fettbildung 5—10 cm. subtrahirte. Bei Weibern fand in beiden Fällen ein Zusatz oder ein Abzug von 5—10 cm. statt.

Hat man nun aus der gefundenen Höhe und dem gefundenen oder resp. mit Rücksicht auf Fett- und Muskelbildung veränderten Brustumfang das physiologische Mittel durch die Tabelle ersehen, so achtet man auf die gemessene Brustbeweglichkeit. Stimmt diese mit der Höhe überein, d. h. beträgt

bei einer Körperhöhe von 157—165 cm die Beweglichkeit 6,5 cm						
oder »	»	»	»	165—170	»	7,0
»	»	»	»	171—175	»	7,5
»	»	»	»	175—180	»	8,0
»	»	»	»	181—191	»	8,5

so kommt sie nicht weiter mehr in Rechnung. Fällt sie aber unter oder über diese Mittel-Werthe, so hat man entsprechend der Differenz im ersten Falle einen Abzug, im zweiten einen Zusatz zur berechneten Vitalcapacität zu machen, und zwar für je 1 cm. der Differenz

bei 70 cm gefund. Brustumf. 140 ccm				bei 81 cm gefund. Brustumf. 186 ccm			
» 71	»	»	144	» 82	»	»	192
» 72	»	»	148	» 83	»	»	198
» 73	»	»	152	» 84	»	»	204
» 74	»	»	156	» 85	»	»	210
» 75	»	»	160	» 86	»	»	216
» 76	»	»	164	» 87	»	»	222
» 77	»	»	168	» 88	»	»	228
» 78	»	»	172	» 89	»	»	234
» 79	»	»	176	» 90	»	»	240
» 80	»	»	180				

Hinsichtlich des Alters, dessen bedeutenden Werth schon Hutchinsohn ziemlich genau angegeben, und auch von Simon, Fabius, Wintrich und Arnold anerkannt wird, richtete ich mich gleichfalls nach des letzteren Angabe, der es für das zweckmäßigste hält, bei Personen, die noch in der Entwicklung begriffen sind und deren Vitalcapacität das der Körpergröße 77 entsprechende Mittel noch nicht erreicht hat, im Verhältniß der Jahre 30—160 ccm. in Abrechnung zu bringen und ebenso bei Personen zwischen 35 und 65 J., bei denen die übrigen körperlichen Verhältnisse einen Alters-

einfluss vermuthen lassen, für jedes Jahr vom 35. J. an 30 ccm. von dem gefundenen Mittel abzuziehen, die wir schon weiter oben (S. 14) ausführlich mitgetheilt haben.

Berücksichtigen wir noch den durch den Stand und die Beschäftigungsweise gegebenen Einfluss, so haben wir — drei Stände angenommen, von welchen der erste wie Seeleute, Soldaten stets in freier Luft körperlicher Uebung und Kraftleistung obliegen, der zweite sich noch ziemlich viel in freier Luft bewegt jedoch durch dumpfe Arbeitslokale immerhin schon geschädigt wird wie die Handwerker etc., der dritte durch eine sitzende Lebensweise wenig und gar keine Gelegenheit zur Lungengymnastik hat, — für den ersten Stand zum physiologischen Mittel 300 ccm., beim zweiten 100 ccm. zu addiren, beim dritten hingegen 100 ccm. zu subtrahiren.

Meine Versuche liess ich sämmtlich stehend ausführen.

Den Geschlechtsunterschied berücksichtigte ich insofern, als ich bei Bestimmung der physiologischen Capacität gleich Arnold bei 140 cm. Höhe und einem Brustumfang von 68 cm. nur 1810 ccm. als Normalmaass annahm mit einer Steigung von je 40 ccm.

Nach den bisherigen Beobachtungen wäre dieser Zusatz allerdings nur bei einer Höhe von 152–174.5 cm. berechtigt, da bei noch grösseren Personen l. i. Classe sich bisher kein Unterschied im Verhältniss zu andern Personen gezeigt hat bei 1 cm. Höhen- und Umfangszunahme. Den Müller Quotienten rechnete ich nach der von demselben weiter oben schon angeführten Methode aus.

Obermedicinalrath Professor v. Ziemssen legte mir nahe, auch bei meinen Berechnungen zu berücksichtigen, in wieferne der Quotient aus der gefundenen Vitalcapacität und der Körperhöhe sich für die Diagnostik verwerthen lasse und in welcher Beziehung er mit dem Müller'schen Quotienten stehe.

(Tabelle I. und II. siehe pag. 46.)

Selbst bei dem flüchtigsten Blicke auf die Tabelle, muß jeder Leser sofort die große Anzahl immenser Differenzen positiver und negativer Richtung frappiren, die sich zwischen der nach Arnold angestellten Berechnung in der gefundenen Vitalcapacität bemerkbar macht. Bei der Berechnung selbst fiel mir wiederholt auf, wie zuerst kleine Differenzen erst dadurch so anwuchsen, daß neben der Höhe und dem Brustumfang die Beweglichkeit mit theilweise Ausschlag gebenden Ziffern berücksichtigt werden mußte. Denn fast Keiner oder nur ganz wenige der von mir untersuchten Personen erreichten die von Arnold als Mittel geforderten Beweglichkeitswerthe. Von den 47 untersuchten Männern mußten bei 37 theils sehr bedeutende Abzüge von dem nach Höhe und Umfange, Stand und Alter berechneten Werthen gemacht werden und darum übersteigt in so vielen Fällen die gefundene Vitalcapacität die berechnete um viele Hundert ccm.

Vor Allem scheint Arnold als Mittelwerth der jeweiligen Brustbeweglichkeit eine zu hohe Zahl angenommen zu haben. Ziehe ich z. B. aus der Brustbeweglichkeit der 143 von ihm zusammengestellten Männer das Mittel, so erhalte ich 7,4 cm., während bei meinen Tabellen das Mittel nur 5,3 beträgt. Außerdem aber halte ich auch die Werthe Arnolds von 1 cm. Beweglichkeit für einen gewissen Brustumfang für etwas zu groß. Will ich nun auch keineswegs behaupten, es hätte die Beweglichkeit gar keinen Einfluß auf das geathmete Luftvolumen, so halte ich für besser, so lange dieser Werth nicht durch eine größere Anzahl Fälle (meine Untersuchungen reichen dazu nicht aus) mit annähernder Sicherheit festgestellt ist, ihn vorerst außer Rechnung zu lassen.

In den folgenden Tabellen habe ich die Arnold'sche Berechnung (jedoch mit Außerachtlassung der Beweglichkeit), ferner den Müller'schen Quotienten sowie den Quotienten v. Ziemffens in Vergleichung gezogen und zwar in Tabelle

III für die Männer und in IV für die untersuchten Personen weiblichen Geschlechts.

Aus diesen beiden Tabellen ergibt sich nun, daß die Arnold'schen Werthe ohne Berücksichtigung der Brustbeweglichkeit bei ganz gefunden Menschen sich etwas mehr der wirklichen Vitalcapacität nähern aber immerhin noch so große Schwankungen erweisen, daß die Berechnung ein einigermaßen haltbares Resultat, aus dem weitere Schlüsse hinsichtlich der Gesundheit des Untersuchten zu ziehen erlaubt wäre, absolut nicht gibt. Hat freilich die wirkliche Vitalcapacität ein minus von mehr als 400 gegenüber der Berechneten ergeben, so hat mit größter Wahrscheinlichkeit die Lunge einen Theil der erforderlichen Passirbarkeit eingebüßt. Was aus den großen positiven Ueberschüssen aber zu machen sei, wie eine beginnende Lungenkrankheit bei Personen, die ehemals mit einer so überreichen Vitalcapacität gesegnet waren und bei denen eine Abnahme selbst von 1000 ccm. gegen früher immer noch den berechneten Werth erreichen oder ihm wenigstens nahe kommen würde, durch den Spirometer sich diagnosticiren lasse, das ist eine Aufgabe, die durch die Arnold'schen Resultate demgemäß nicht als gelöst betrachtet werden kann.

Es mag nun freilich dem entgegengestellt werden, daß Arnold seine Schlüsse auf mehrere tausend Fälle (die er theils selbst untersucht, theils als die Untersuchung Anderer in seiner Arbeit verwerthet hat), aufgebaut, während hier nur einige achtzig Fälle dem entgegenstehen. Ich bin auch weit entfernt, den hohen Werth der Arnold'schen Untersuchungen im geringsten in Zweifel zu ziehen, nur glaube ich, daß, wenn unter etwa 90 Fällen sich schon so viele und so bedeutende Ausnahmen von der Regel geltend machen, der Werth der Regel selbst in Frage kommt.

Auch hinsichtlich des Müller'schen Quotienten sind wir zu anderen Resultaten gekommen, als wir sie füglich nach dessen früher erwähnten Schrift erwarten durften und mußten.

Während nämlich Müller bei feinen 129 Dorfbewohnern den Werth seines Quotienten stets im Werthe von 6,0—7,6 sieht und einen Mittelwerth von 7,0 festsetzt, während er diesen Quotient an 18 Fällen in der Stadt Wiesbaden um 1,0 verschoben sieht, wofür er den Grund in der schlechten Luftbeschaffenheit sucht, zeigt sich in den vorliegenden Tabellen III und IV der Quotient bei vollkommen gefunden Personen zwischen 7 und 12 schwankend. Müller bestreitet auch, daß der Geschlechtsunterschied seinen Quotienten ändere, während sich bei Männern im Allgemeinen niedere Werthe finden als bei Weibern: wohl infolge des durch die erhöhte Vitalcapazität bei Männern vergrößerten Divisors, mit dem die Vermehrung des Dividenden d. h. des Brustumfanges und der Rumpfhöhe nicht gleichen Schritt hält. Gemäß unserer Tabelle kann man einen pathologischen Zustand der Lunge erst mit Sicherheit annehmen, wenn der Müller'sche Quotient über 12 beträgt, wobei noch zu untersuchen wäre, ob die Werthe zwischen 11—12 nicht zu den suspecten zu zählen seien.

Eine Erklärung für meine relativ hohen Werthe halte ich vorerst für gewagt. Wenn übrigens zwischen Wiesbaden und dem Lande schon so große Differenzen sich bemerkbar machen, so mag ja immerhin die in München jedenfalls weniger reine Luft als die Wiesbadens ihren Theil dazu beitragen. Ist das richtig, so müßte man für jeden Ort schließlich einen eigenen Quotienten als Mittelwerth berechnen.

Ein weit höheres Gewicht lege ich jedoch auf den Altersunterschied der von Müller und mir untersuchten Personen.

Während nämlich das Durchschnittsalter bei Müller 13 Jahre beträgt und das 16. oder 18. Jahr nur von wenigen Personen überschritten ist, habe ich durchwegs ältere Leute untersucht, welche auf der Höhe ihrer Entwicklung stehen und deshalb zu der größtmöglichen Ausdehnung ihrer Lunge befähigt sind. Gemäß der vorliegenden Tabelle werden sich die Personen, deren Quotient unter 12 beträgt, einer guten

Gefundtheit quoad pulmonem erfreuen, während höhere Quotienten eine mehr oder minder große Beeinträchtigung der physiologischen Beschaffenheit kennzeichnen.

Gehen wir noch zu dem letzten von v. Ziemssen aufgestellten Quotienten über, so finden wir auch hier große Unterschiede zwischen den Quotienten des männlichen und weiblichen Geschlechtes, insoferne man den Satz aufstellen kann, wenn bei Männern der v. Ziemssen'sche Quotient über 18 und bei Weibern über 12 beträgt, so sei die Lunge als gesund zu betrachten, wenigstens mit demselben Rechte, als der Arnold'sche berechnete Werth zur Richtschnur genommen wird, denn die Arnold'schen und v. Ziemssen'schen Werthe gehen stets auch da, wo Müller andere Resultate liefert, Hand in Hand, nur den einen Fall von Nro. I der Männer ausgenommen, wo nach v. Ziemssen eine Krankheit vorliege, während Müllers Quotient und Arnolds gefundener Werth das Individuum gesund erscheinen lassen. Wer übrigens das in seiner Entwicklung zurückgebliebene Individuum gesehen hat, ist weit eher geneigt daselbe für einen angehenden Phthisiker zu halten als nicht. Den Vorzug vor der Arnold'schen Berechnung hätte der v. Ziemssen'sche Quotient übrigens vor Allem seiner Einfachheit halber, denn während derselbe leicht sich in $\frac{1}{2}$ Minute berechnen läßt, erfordert die Arnold'sche Berechnung sammt allen zu berücksichtigenden Massen und Verhältnisse mindestens die zehnfache Zeit.

Gleichwohl liegt mir ferne, in ihm das erreichte Ziel für spirometrische Untersuchungen zu betrachten. Er ist und soll nur sein ein Mittel zu rascher Orientirung, ob die von einem Individuum ausgeathmete Vitalcapacität seinem Körper entspricht oder als pathologisch zu betrachten sei. Dabei wäre immerhin wünschenswerth, zu eruiern, ob die aus der Tabelle festgesetzte Grenze 18 für Männer und 12 für Weiber auch in einer größeren Reihe von Fällen, als sie mir zu Ge-

bote standen, als genau bezeichnet werden kann. Von denjenigen Fällen, die in Uebereinstimmung aller drei Methoden als krank sich erweisen, wie Nro. 17 und 38 bei den Weibern, ist nach meinem Dafürhalten auch ohne physikalisch den Nachweis liefern können, eine evident phthisische Anlage anzunehmen. Nur in zwei Fällen nämlich bei 47 (männl.) und 41 (weibl.) liegen der Abnahme der Vitalcapacität andere Ursachen zu Grunde, nämlich im ersten Falle ein sehr großer Ascites, in letzterem ein sehr ausgebreitetes Emphysem.

Aus den vorliegenden Beobachtungen dürfte somit der Schluss gerechtfertigt sein, dass alle drei Methoden geeignet sind, einen ungefähren Schluss auf den physiologischen oder pathologischen Zustand der Lunge zu ziehen, ohne dass wir bis jetzt jedoch eine scharfe Grenze zwischen beiden aufstellen konnten. Da mit allen drei Methoden gleichviel erreicht wird, so ergibt sich von selbst, dass die einfachste den Vorzug verdient und das ist wohl die v. Ziemssen'sche.

Am Schlusse meiner Arbeit erübrigt mir noch die angenehme Pflicht, insbesondere meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Obermedicinalrath Prof. Dr. v. Ziemssen, für die mir gütigst ertheilten Winke, sowie für die auferst lebenswürdige Ueberlassung des Materials meinen besten Dank auszusprechen, wie auch nicht verfäumen darf, Herrn Privatdozenten Dr. Pöfselt für die mir gütigst zur Verfügung gestellten Fälle bestens zu danken.

I. Tabelle für die unter

Laufende Nr.	Stand	Alter	Gewicht	Körperhöhe	Rumpfhöhe	Brustumfang über die Brustwarzen	Compensation d. Brustumfangs je nach Muskel u. Fettenwicklung	Brustumfang nach Müller	Brustmaasse bei größter In- und Expiration	Beweglichkeit der Brust	Puls	Respiration
1	Metalldrucker	16	40000	143	52	75	+2	70	69—75	6	96	22
2	Tapezierer	29	43800	150	56	78	+3	78	78—82	4	100	32
3	Schneider	51	51720	158,5	63,5	82	+1	78	77—80	3	68	24
4	früher Schneider, dann Strohhutmacher	59	58850	159,5	65	88	—	84	83—91	8	96	24
5	Hafner	15	55000	160	62	82	+3	79	78—84	6	68	18
6	Schneider	49	57800	160	63	87	+4	87	86—89,5	3,5	94	26
7	Zimmermann	50	49610	160	63	89	—1	87	86—89,5	3,5	100	22
8	Schuhmacher	28	55150	161,5	61,5	85	—1	80	79—85	6	88	22
9	Hausknecht	29	57400	161,5	68	86	—1	83,5	82—87	5	100	24
10	Schreiner	38	61900	162	66	91	+2	88	86—90,5	4,5	96	20
11	Bildhauer	16	—	162	56	78	+3	75	74—80	6	84	24
12	Bäcker	20	51150	162	63	83	+2	81	80—85,5	5,5	94	24
13	Maler	33	63000	163	67	88	—	85	84—90	6	80	20
14	Lackirer	38	61100	163,5	72	91	—	88	85—91,5	6,5	98	22
15	Hutmacher	38	52450	164	66	84	+2	83	81—85	4	98	24

suchten männlichen Individuen.

Magen- und Darmfüllung	Gefundene Vital- capacität	Berechn. Vitalcap nach Arnold	Differenz	Müller'scher Quotient	v. Ziemssen'scher Quotient	Gefundheitszustand
Vor dem Mittageffen und bei regelmäßigem Stuhlgang	2400 1800	2674 2598	-274 -798	8,448 15,062	16,78 12,00	Epilep. sonst gesund. Ohne hered. Belast. Phthife: Vor 1 1/2 J. Hämoptoe. Starker Huften. Nachtschweifse. Keine hered. Belast. Infiltrat. beider Leberlappen bef. R. wo d. Dämpfung bis zur 2. Rippe reicht u. H. fast bis zum An- gulus scapulae. Exspirat. verlängert. HOR u. L bronchial. Exspir.
	2500	2495	+5			Huften, Nachtschweifse, keine hered. Be- lastung. HO Schall kürzer als normal. L. V. O. verlängert, und verschärftes Expirium. LHO. bronchiales weiter unten unbestimmtes Athmen. R.V. un- bestimmtes Athmen.
	3000	3217	-217	12,15	18,808	Tremor d. obern Extrem. u. d. Kopfes. Lungengr. nach allen Seiten verbreitert. Schall hypofonor. Athemgeräusch, be- fond. hinten rauh. Exspir. verlängert.
	3500 2800 1800	3304 2568 2632	+196 +232 -832	8,797 13,556 21,08	21,875 17,5 10,25	Gefundes Indiv. ohne hered. Belastung. Ausgesprochene Phthife. Beide Spitzen besonders R. gedämpft, bis zum Spina scapulae. Lungengren- zen reichen H weit hinunter. Groß- blasige Rasselgeräusche.
	3350 3400	3303 3277	+47 +123	9,296 11,096	20,74 21,05	Gefundes Indiv. ohne hered. Belastung. Ueber d. Lungen u. Herz kein path. Bef. Ohne hered. Belast.
	3300 3150	3220 3160	+80 -10	12,324 7,957	20,37 19,44	Ueber d. Lungen u. Herz kein path. Be- fund. Ohne hered. Belast. Seit 8 Tg. Huften u. Auswurf, heredit nicht belastet. Ueber die Lungen rollen Schall u. reines vesikularathmen mit Ausnahme der rechten Spitze, wo das Athemgeräusch verschärft ist. Herz- befund normal. Spitzenkatarrh.
	3400 4000 3900	3236 3610 3775	+164 +390 +125	9,674 9,630 11,376	20,98 24,47 23,85	Gefundes Indiv. ohne heredit. Belast. " " " " " " " " " " Expirium durchgehends verlängert, sonst Lungen- und Herzbefund normal. Ohne hered. Belast.
	2400	3090	-310	15,075	14,63	Phthisis: HRO. Dämpfung bis 3 Finger unter die Spina scap., ebenso L. R. V. bis zur dritten Rippe. L. mit Ausn. d. Spitze fonorer Schall. RH unbeft. Athmen u Rasselgeräusche. V. groß- blasige Rasselger.

Laufende Nr.	Stand	Alter	Gewicht	Körperhöhe	Rumpfhöhe	Brustumfang über die Brustwarzen	Compensation d. Brustumfangs je nach Muskel- u. Fetentwicklg.	Brustumfang nach Müller	Brustmaasse bei größter In- und Expiration	Beweglichkeit der Brust	Puls	Respiration
16	Steinmetz	28	57000	165	64,5	85	+4	83,5	81—85,5	4,5	80	20
17	Metzger	21	60000	166,5	57	88	—2	85,5	83—89	6	100	24
18	Gelbgießer	25	62710	166,5	65	88	—	87	85—90	5	100	22
19	Schlosser	25	66550	166,5	63	88	+2	86	85—91,5	6,5	80	22
20	Gärtner	41	52000	166,5	61	80	+2	78	76,5—82	5,5	68	38
21	Schuhmacher	26	48300	167	65	81	+3	79	76—82	6	76	18
22	Schuhmacher	21	57430	167	70	84	+2	84	82—88	6	90	22
23	Gärtner	22	52420	167,5	58	84	+1	80,5	79—85	6	80	18
24	Bierbrauer	31	66350	168	62,5	95	—	93	92—99	7	60	18
25	Eisenbahnaufst.	27	67000	168	62	92	—	90	86—97	11	80	20
26	Metzger	17	55570	168	61,5	80	—	78	77—84	7	76	24
27	Kutscher	30	71460	168,5	66	94	—1	93	90—99	9	76	20
28	Hausknecht	28	—	169	67	96	—	94	93—97	4	92	22
29	Friseurgehilfe	20	67730	170	63,5	96	—5	86	84,5—95	10,5	100	22
30	Schäffler	28	66450	170,5	70	90	—	88	86—91	5	76	18
31	Schlosser	36	55730	171	66	84	+3	82	81—85	4	98	32
32	Pflasterer	31	56350	171	65	84	—	82,5	81—86	5	88	22
33	Bierabzapfer	48	60880	171,5	66	88	+2	85	83—88	5	68	24

Magen- und Darmfüllung	Gefundene Vital- capacität	Berechn. Vitalcap. nach Arnold	Differenz	Müller'scher Quotient	v. Ziemssen'scher Quotient	Gefundheitszustand
Vor dem Mittageffen und bei regeltem Stuhlgang	3600 4000 2400	3292 3499 3319	+300 +501 -919	9,038 8,287 16,318	21,83 24,02 14,41	Gefundes Indiv. ohne hered. Belastung. Gefund. Indiv. Mutter an Phthise gest. Huften, Auswurf, Nachtschweißse. Hered. belastet. Ueber beiden Lungen spitzen Dämpfung u. unbest. Athmen, Klingen- des Rasseln. Dämpfung geht bis zur 2. Rippe beiderseits. (Phthise.)
	4300 3100 3400 4200	3715 3307 3366 3414	+585 -207 +34 +786	8,624 9,524 9,492 9,855	25,82 18,62 20,86 25,15	Gefundes Individ. ohne heredit. Belast. " " " " " " " " " " Hered. belastet. (Vater an Phthise gest.) Gefundes Individ.
	4200 5000	3565 4030	+635 +970	7,119 8,974	25,07 29,76	Gefund. Indiv. Vater an Lungenfucht gest. Spitzenkatarrh. Seit mehreren Monaten starken Huften. Schon mehrere Male die Lungenentz. durchgemacht. Vater an Phthise gest. Die Percussion gibt keine Differenz. L.V.O. verlängertes Exspirium. Lungengrenzen gut ver- schieblich.
	5200 3300	4900 3595	+300 -295	7,70 9,02	30,85 19,64	Gefundes Indiv. ohne hered. Belastung. Gefundes Indiv. Vater u. Schwester an Phthise gestorben.
	5000 2900	4501 3262	+499 -362	9,08 16,24	29,67 17,16	Gefundes Indiv. ohne hered. Belastung. Linke Spitze Spur höheren Schalles als rechts. Ueber die Spitzen verlängertes Exspirium. Trockene Ronchi, Infuff. u. Stenose der Mitralostier. Ohne hered. Belastung.
	4600 4500 2800	4725 3475 3103	-125 +1025 -303	9,765 9,583 12,608	27,05 26,34 16,37	Gefundes Individ. ohne heredit. Belast. " " " " " Hered. belastet. Phthise Mitralinfuff. Seit 4 J. stark. Huften, Nachtschweißse. Im Sommer bedeut. Besserung. V.R.O. Schall kürzer als L., R. u. L.V.O. Exspirium bedeut. verlängert mit bron- chial. Charakter. H.R.O. bronchial. Exspirium. An d. Spitze systol. Ger.
	4100	3280	+920	8,584	23,976	Thorax etwas fassförmig, Herzdampf überlagert. RHO Schall etwas kürzer als links. Leichtes Emphysem.
	3000	3385	-385	11,309	17,499	Vater, Mutter u. Schwester an Phthise gest. Seit einigen Tagen Huften. In- suffic. d. Aortaklappen m. ger. links- seitig. Hypertrophie. Ueberall sonorer Lungenschall, nur R.H.U. Schall kürzer als links. Ueberall Vesikularathmen.

I laufende Nr.	Stand	Alter	Gewicht	Körperhöhe	Rumpfhöhe	Brustumfang über die Brustwarzen	Compensation d. Brustumfanges je nach Muskel- u. Fettentwicklg.	Brustumfang nach Müller	Brustmaasse bei größter In- und Expiration	Beweglichkeit der Brust	Puls	Respiration
34	Zimmermann	63	55950	172	65	85	+3	82	80—85	5	84	22
35	Schäffler	39	51300	172	61	86	+3	86	85—88	3	120	24
36	Bergmann	33	63930	172	63	92,5	+5	90	89—94	5	60	20
37	Bierbrauer	23	65350	173	69	90	—	89	87—92	5	94	24
38	städt. Arbeiter, fr. Kaminkehrer	36	69650	173	71	92	—	89	87—92	5	92	18
39	Zinngießer	30	42700	173,5	62,5	78	+5	77	75—80	5	100	32
40	Maurer	27	75000	174	69	97	—2	95	93—102	9	96	18
41	Scribent	26	63310	174,5	69	89	—	85	83,5—91,5	8	80	24
42	Bäcker	19	56410	174,5	68	82	+2	80	79—83,5	4	88	20
43	Tagelöhner	27	57250	175,5	67	80	—	78	77—86,5	9,5	104	24
44	Viehschaffner, früh. Bierführer	47	87100	177	72	105	—2	104,5	102—107	5	96	20
45	Bierbrauer	24	72950	177,5	70	96	—	94	92—97	5	84	24
46	Schreiner	26	66350	178,5	72	92	—	87	89—93	4	84	24
47	Wäger, früher Schäffler	59	77480	182	68	92	+3	92	90—93	3	64	32

Magen- und Darmfüllung	Gefundene Vital- capacität	Berechn. Vitalcap. nach Arnold	Differenz	Müller'scher Quotient	v. Ziemssen'scher Quotient	Gesundheitszustand
Vor dem Mittageffen und bei regeltem Stuhlgang	3900	3386	+514	8,917	22,67	Carcinoma ventric. Sonst nichts path. nachweisbar. Ohne hered. Belastung.
	2800	3044	-244	12,822	16,28	Seit 7 Mt. Husten u. Stechen, Nachtschweißse. Appetit u. Stuhl regelm.
						L V.O. Schall tympanitisch. Abwärts von d. Clavicula fonorer Schall. LHO Schall gedämpft, RH Schall abgekürzt.
	4000	3460	+540	20,152	23,25	L V.O. bronchiales Athmen. In den untern Partien fonorer Schall.
						Ohne hered. Belast. Bei Husten R. u. L. Schmerzen. Schall beiderf. abgekürzt.
	3700	3430	+270	11,11	21,88	In den unteren Partien fonor. Athemgeräusch, überall vesicul. Eutercatarrh.
	5000	3460	+1540	8,959	28,90	Gefundes Indiv. ohne hered. Belastung.
						" " " " "
	900	3340	-2440	32,764	5,185	Phthise: Vater, Mutter u. Schwester an Phthise gest. Seit 1 Jahr krank. Ende Juli starke Hämoptoe. R V.O. bis zur 3. Rippe. Schall tympan. H Dämpfung beiderseits bis zur Spina Scapulae.
	5500	4615	+885	9,009	31,609	RV. amphor. Athmen, RH. Knacken, LH. bronchial. Athmen, LV. bronch. Exspirium.
	5050	4162	+888	7,85	27,0	Gefundes Individ. Vater an Phthise gest. Seit 4 Jahren etwas Auswurf u. Nachtschweißse. Ohne hered. Belast. HO. Schall beiderseits gedämpft. Exspirium verlängert, Lungengrenzen ausgiebig verschieblich. (Diagn. Spitzenkatarrh.)
	4200	3283	+917	8,245	24,068	Gefundes Indiv. ohne hered. Belastung.
	4500	4150	+350	7,208	25,64	" " " " "
	4400	3616	+784	10,28	24,85	Lungen norm. befund. Ohne hered. Belastung.
	4700	3517	+1183	10,47	26,48	Gefundes Indiv. Vater an Phthise gest.
	4100	3247	+853	11,807	20,168	Gefundes Indiv. ohne hered. Belastung.
	1550	3100	-1650	23,125	8,57	Nephritis chronica, Myodegeneratio cord. (Lebertumor?) Abdomen bedeut. ausgedehnt. Mäßiges Oedem der untern Extremität. Untere Lungengr. beiderseits wenig verschieblich. In den obern Lungen-Parteien fonor. Schall. Ueber den Lungen leichter Catarrh. Herzaktion regelmäsig. Herzdämpfe nicht vergrößert.

II. Tabelle für die unter

Laufende Nr.	Stand	Alter	Gewicht	Körperhöhe	Rumpfhöhe	Bruustumfang über die Brustwarze	Compensation d. Bruustumfanges je nach Muskel u. Fettentwicklg.	Bruustumfang nach Müller	Bruustumfang bei tiefter In- und Expiration	Beweglichkeit der Brust,	Puls	Respiration
1	Corsettenmacherin	19	38030	140,5	57	70	+5	63	62—68	6	88	20
2	Dienstmädchen	32	47600	144	56	76	+7	73	72,5—74	1,5	92	24
3	Buffetdame	21	38700	145	59	72	+6	67	66—68	2	88	24
4	Dienstmädchen	15	37600	145	52	68	—	66	65—70	5	80	24
5	Näherin	34	44000	147	62	76	+4	71,5	71—73	2	96	24
6	Stickerin	19	48160	147	62,5	76	+4	71	70—72	2	80	20
7	Kellnerin	25	60000	149	62	85	—2	76	75—79	4	108	24
8	Dienstmädchen	18	52980	150,5	63	81	—	85	74—77	3	96	20
9	Dienstmädchen	23	61820	151	64	88	—4	80,5	80—82	2	64	24
10	Köchin	27	84800	157	61	86	—3	76	75—78	3	80	20
11	Köchin	60	46270	152	64	74	+5	71	70—72	2	60	28
12	Dienstmädchen	22	55180	152	63	81	—	76	75—78	3	88	26
13	Dienstmädchen	21	55120	152	65	83	—	78	77—80	3	60	24
14	Stickerin	25	47850	152,5	62	72	+4	68	67—72	5	108	28
15	Dienstmädchen	21	54500	153	61	87	—	78	75—83	8	100	20
16	Kellnerin	19	49650	154,5	62	74	+4	67	66—72	6	84	24
17	Köchin	18	57490	154,5	66	84	—3	73	72—74	2	—	28
18	Köchin	37	44350	155	63,5	73	+6	70,5	70—73	3	96	24
19	Tapezierersfrau	33	46530	155,5	63	77	+3	72	71,5—74,5	3	84	22
20	Dienstmädchen	18	50100	157,5	59	83	+3	73	72—76,5	4,5	80	20
21	Schäfflersfrau	42	53330	157,5	61	82	+4	77	76—80,5	4,5	80	20

suchten weiblichen Individuen.

Magen- und Darmstellung	Gefundene Vital- capacität	Berechn. Vitalcap. nach Arnold	Differenz	Müller'scher Quotient	v. Ziemschen'scher Quotient	Gefundheitszustand
Vor dem Mittageffen und ohne Obstipation.	2000	1965	+35	9,001	15,65	Gefundes Individ. ohne hered. Belastung.
	2300	2190	+110	10,31	15,69	Gefundes Individ. ohne heredit. Belastung.
	1600	2110	-510	13,17	11,034	Pat. leidet an P. nmetritis. Zu Katarrhen sehr geneigt. Graciler Bau. Ueber der rechten Spitze Schall etwas ge- dämpft. Exspirium etwas verlängert. Athemungsp. überall vesicular.
	2000	1910	+90	8,960	13,79	Gefundes Individ. ohne hered. Belastung.
	1900	2190	-490	13,275	12,925	Mutter an Phthisi †. Nichts Patholog. nachweisbar.
	1600	2190	-590	16,86	10,88	Mutter an Phthisi †. Sehr gracil. Nichts nachweisbar.
	2400	2290	+110	11,87	16,107	Gefundes Individ. Vater an Phthisi ge- storben.
	2800	2280	+520	10,071	18,60	Gefundes Individ. Ohne heredit. Bel.
	2600	2350	+250	9,539	17,21	Gefundes Individ., aber heredit. belastet.
	2000	2330	-330	14,018	13,245	Gefundes Individ. ohne hered. Belastung.
	1200	2270	-1070	20,328	7,89	Phthisi.
	2100	2310	-210	13,712	13,815	Ohne hered. Belastung. Nichts Pathol. nachweisbar.
	3100	2350	+750	10,151	30,39	Ohne hered. „ „ „ nachweisbar.
	1400	2225	-825	16,29	9,18	Vater an Phthise †. Hochgradig hyste- risches Individuum. HO beiderseits Schall kürzer als normal. Verl. Exspir.
	3000	2450	+550	10,168	9,607	Gefund. Individ. ohne hered. Belastung.
	2300	2305	-5	8,078	14,886	„ „ „ „ „
	1800	2365	-565	—	11,650	Erysipelas faciei. Sonst gesund ohne hered. Belastung.
	1800	2330	-530	13,958	11,645	Phthisis. Mutter und Bruder an Phthise †. L. V. Schall gedämpft bis zur 3. Rippe. H. bis zur Mitte der Skapula. In den hintern Partien bronchial. Athen. In der linken Spitze Schall abgekürzt, in den untern Partien sonorer Schall.
	2000	2365	-365	12,637	12,861	Typhusreconvalescentin. Sonst gesund. Ueber der Lunge voller Schall Exspir. etwas verlängert. Ohne hered. Belast- ung.
	3100	2510	+590	8,069	19,68	Gefundes Individ. ohne hered. Belastung.
	3550	2510	+1040	8,107	22,54	Erysipelas faciei. Sonst gesund. Ohne hered. Belastung.

Laufende Nr.	Stand	Alter	Gewicht	Körperhöhe	Rumpfhöhe	Brustumfang über die Brustwarze	Compensation d. Brustumfanges je nach Muskel u. Fettenwicklg.	Brustumfang nach Müller	Brustumfang bei tieffter In- und Expiration	Beweglichkeit der Brust	Puls	Respiration
22	Köchin	26	61810	158	62	91	-7	81	80-83	3	100	24
23	Näherin	23	49250	158	63	85	+3	77,5	77-79	2	112	24
24	Köchin	23	56910	188,5	67,5	84	-	71	70-74	4	104	38
25	Köchin	26	59170	158,5	63	84	-	76	74-79	5	80	22
26	Dienstmädchen	16	46000	159	58	75	+3	69	68-71	3	108	22
27	Ladnerin	19	53200	159	63	80	-3	72	70-75	5	100	24
28	Näherin	34	45640	159	62	75	+5	71	69-71,5	2,5	104	32
29	Dienstmädchen	20	67700	159,5	64	93	-6	85	84-88	4	108	28
30	Dienstmädchen	17	65400	159,5	64	88	-7	77	76-82	6	92	22
31	Kellnerin	25	48250	160	64	85	-	76	75-78	3	104	28
32	Köchin	19	56450	160	62	83	-2	78	75,5-81	5,5	120	26
33	Dienstmädchen	19	57300	160	65	86	-4	79	77-82,5	5,5	88	28
34	Kellnerin	33	55650	160,5	62	83	-	75,5	75-77	2	86	24
35	Köchin	31	54890	160,5	63	82	-	76	75-78	3	104	26
36	Dienstmädchen	17	46350	160,5	63,5	77	-	72	70-75	5	104	24
37	Köchin	28	50450	161	63	81	-	75	72-79	7	80	22
38	Zugeherin	42	49000	162	63	78	-	75	74-78	4	80	20
39	Näherin	16	51600	162	61,5	85	-3	74	73-78	5	96	20
40	Dienstmädchen	22	56450	164	63	85	-3	74	73-77	4	80	24
41	Handlerin	67	60380	168	69	77	+5	76	75 ¹ / ₂ -79	3,5	68	28
42	Kellnerin	19	61210	171	70	86	-3	76	75-80	5	100	22

Magen- und Darmstellung	Gefundene Vital- capacität	Berechn. Vitalcap. nach Arnold	Differenz	Müller'scher Quotient	v. Ziemssen'scher Quotient	Gefundheitszustand
Vor dem Mittageffen und ohne Obstopation	3100	2490	+610	10,44	19,62	Gefundes Indiv. ohne hered. Belastung.
	2950	2570	+380	10,207	18,72	Typhusreconvalescentin. Gefund. Ohne hered. Belastung.
	2400	2500	-100	11,22	13,14	Mutter an Phthise gest. Pat. leidet an Uler, ventriculi u. Cardialgie, Abends öfters Husten. Lungenbef. nicht path.
	3000	2500	+500	7,00	18,92	Mutter an Phthisi †. Gefundes Indiv.
	2300	2390	-90	9,554	14,465	Gefundes Indiv. ohne hered. Belastung.
	3000	2370	+630	8,66	18,868	Herz etwas nach rechts verbreitert. Sonst kein patholog. Befund. Ohne hered. Belastung.
	650	2430	-1780	38,26	4,088	Phthise: Beide Spitzen hinten gedämpft. Exspir. R. H. O. verschärft. Rasselgeräusche, L. H. O. Exspir. bronchial. als R. Athmungsg. überall vesicular.
	3600	2585	+1015	10,22	20,06	Bruder an Phthise gestorben. Das Individuum leidet an Chlur u. Parametritis. Auf der Lunge linke Spitze etwas kürzer als R.
	2550	2465	+85	11,84	16,0	Mutter an Phthise †. Gefundes Indiv.
	2700	2550	+150	10,895	16,75	Gefundes Indiv. ohne hered. Belastung.
	3100	2450	+650	9,682	19,375	" " " " "
	2400	2490	-90	13,450	15,00	" " " " "
	1400	2525	-1125	20,998	8,722	Sehr starkes Seitenstechen. Husten und Auswurf. Die Patientin ist hereditär sehr belastet. Sie trat aus dem Spital aus, bevor sie von mir untersucht worden war.
	3300	2505	+795	8,774	20,56	Ulc. ventric. Sonst kein pathol. Befund. Ohne hered. Belastung.
	2400	2405	-5	10,214	18,068	Typhusreconvalescentin. Gefund ohne hered. Belastung.
	3100	2490	+610	9,096	19,25	Gefund. Indiv. ohne hered. Belastung.
	1700	2450	-750	16,588	10,5	Ueber d. Brustorgane kein path. Befund. Durch die Mutter hered. Belastung.
	2700	2350	+170	10,102	16,666	Ueber dem Brustorgane kein path. Befund. Durch die Mutter hered. Belastung.
	2600	2570	+30	10,558	15,853	Magenkatarrh. Sonst nichts Patholog. nachweisbar. Vater u. Mutter an Phthisi gestorben.
	1500	2650	-1150	21,443	8,928	Sehr ausgebreitetes Emphysem. Sehr ungeschickte Person.
	2500	2730	-2,30	12,874	14,62	Vater an Lungenl. gest. Patient leidet an Chlorose. Sonst gesund.

III. Tabelle (Männer).

Laufende Nr. der Personen	Müller'scher Quotient	v. Ziemssen's Quotient	Differenz zwischen Arnolds Be- rechnung n. d. gefund. Capac.
23	7,119	25,07	+ 425
42	7,208	25,64	— 10
25	7,70	30,95	+ 1260
41	7,85	29,00	+ 1002
11	7,95	19,44	— 100
42	8,25	24,07	+ 305
17	8,29	24,02	+ 285
I	8,45	16,78	— 358
32	8,58	23,98	+ 410
19	8,624	25,82	+ 465
5	8,80	21,87	+ 100
38	8,959	28,90	+ 910
34	8,92	22,67	— 50
24	8,97	29,76	+ 970
40	9,00	31,61	+ 1290
26	9,02	19,64	— 295
27	8,08	29,67	+ 1015
8	9,30	20,74	— 55
22	9,36	25,15	+ 570
21	9,49	20,36	— 170
20	9,52	18,62	— 495
30	9,58	26,34	+ 545
13	9,63	24,47	+ 270
12	9,67	20,98	— 40
29	9,76	27,05	+ 735
16	9,94	21,83	— 160
36	10,152	23,25	— 120
44	10,28	24,85	+ 170
45	10,47	26,48	+ 255
46	10,57	20,11	— 155
9	11,09	21,05	— 182

Nummer	Müller's Quotient	v. Ziemssen's Quotient	Arnold's Differenz
37	11,11	21,38	— 330
33	11,31	17,49	— 970
14	11,38	21,85	+ 125
4	12,15	18,81	+ 135
3	12,30	15,77	— 485
10	12,37	20,37	— 400
31	12,61	16,37	—1080
35	12,82	16,28	—1180
6	13,56	17,5	— 470
2	15,06	12,00	—1170
15	15,07	14,63	— 850
28	16,24	17,16	—1190
18	16,32	14,4	—1375
7	21,08	10,25	—1570
47	23,13	8,57	—2000
39	32,76	5,18	—2935

Fälle, in denen die 3. Methode in ihren Resultaten von einander abweichen.

Nummer	Müller's Quotient	v. Ziemssen's Quotient	Arnold's Differenz
I	8,45	16,78	— 358
33	11,31	17,49	— 970
4	12,15	18,81	+ 135
10	12,37	20,37	— 400

IV. Tabelle (Weiber).

Laufende Nr. der Personen	Müller's Quotient	v. Ziemssen's Quotient	Differenz zwischen Arnolds Be- rechnung u. d. gefund. Vitalit.
25	7,00	18,92	+ 500
20	8,06	19,68	+ 590
16	8,07	14,88	— 05
21	8,11	22,54	+ 1040
27	8,66	18,87	+ 630
35	8,77	20,56	+ 795
4	8,96	13,79	+ 90
1	9,00	15,65	+ 35
37	9,09	19,25	+ 610
9	9,53	17,21	+ 250
26	9,55	14,46	— 90
32	9,68	19,37	+ 650
8	10,07	18,60	+ 520
39	10,10	16,66	+ 170
13	10,15	20,39	+ 750
15	10,17	19,60	+ 559
23	10,20	18,72	+ 380
29	10,22	20,06	+ 1015
2	10,31	15,69	+ 110
22	10,44	19,62	+ 610
40	10,558	15,85	+ 30
31	10,89	16,75	+ 150
36	10,91	18,06	— 05
24	11,22	15,14	+ 100
30	11,84	16,00	+ 85
7	11,87	16,10	+ 110
19	12,63	12,86	+ 365
42	12,87	14,62	— 230
3	13,17	11,034	— 510
5	13,27	12,92	— 290
33	13,45	15,00	— 90

Nummer	Müller's Quotient	v. Ziemssen's Quotient	Arnold's Differenz
12	13,71	13,81	— 210
18	13,95	11,64	— 530
10	14,02	13,24	— 330
17	15,54	11,65	— 565
14	16,29	9,18	— 825
38	16,58	10,5	— 750
6	16,66	10,88	— 590
11	20,32	7,89	— 1070
34	20,998	8,722	— 1125
41	21,14	8,93	— 1150
28	38,26	4,08	— 1780

Fälle, in denen die drei Methoden in ihren Resultaten von einander abweichen.

Nummer	Müller's Quotient	v. Ziemssen's Quotient	Arnold's Differenz
19	12,63	12,86	+ 365
42	12,87	14,62	— 230
5	13,27	12,92	— 290
33	13,45	15,00	— 90
12	13,71	13,81	— 210
10	14,02	13,24	— 330

LITERATUR:

- John Hutchinson:* on the capacity of the lungs etc. Medico. chirurg. transact. v. 29 p. 137. Deutsch von Dr. Samosch, Braunschweig 1849.
- Gustav Simon:* Ueber die Menge der ausgeathmeten Luft bei verschiedenen Menschen. Giessen 1848.
- Fabius:* De spirometro ejusque usu Dissert. Amstr. 1853. Im Auszug im Archiv für wissenschaftliche Heilkunde. Bd. 1 Hft. 3 S. 504 und in der Zeitschrift für rationelle Medicin N. F. B. 4 H. 2 S. 281.
- Voorhelm Schneevogl:* Ueber d. prakt. Werth des Sperometers. Zeitschrift für rationelle Medicin. Neue Folge B. 5.
- M. A. Wintrich:* Krkht. d. Respirationsorgane B. V erste Abth. von Virchows Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. Erlangen 1854.
- Friedr. Arnold:* Ueber die Athmungsgrösse des Menschen. Ein Beitrag zur Physiologie und zur Diagnostik der Krkht. der Athmungswerkzeuge. Heidelberg 1855. Mohr.
- Carl Wilhelm Müller:* Die vitale Lungencapacität und ihre diagnostische Verwerthung. Göttinger Inauguraldiss. Leipzig 1868.
- L. Waldenburg:* Die pneumatische Behandlung der Respirations- und Circulationskohlen im Anschluss an die Pneumoatometrie und Spirometrie. S. 108 u. ff. Berlin 1880. 2. Aufl.

